

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Ред. №	20000402
Разрешение №	BG/MK7/KP-56797
Датум	30.11.2021

Листовка: Информация за лекарството

Лимфомиозот таблетки
Lymphomyosot tablets

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Лимфомиозот и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Лимфомиозот
3. Как да използвате Лимфомиозот
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лимфомиозот
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Лимфомиозот и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Прилага се при лимфостазата (оток) от различен произход – следоперативна, следтравматична, статична; лимфаденити; тонзиларна хипертрофия и хроничен тонзилит.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Лимфомиозот

- Не приемайте Лимфомиозот, ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта. Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте с лекар, преди приемането на този лекарствен продукт.

Употреба на други лекарства

Не са известни лекарствени взаимодействия

Употреба на Лимфомиозот с храна, напитки и алкохол

Не са известни несъвместимости

Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.



Шофиране и работа с машини

Лимфомиозот не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Лимфомиозот

Ако не сте сигурни в начина на приложение, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При възрастни и деца над 6 год. възраст - обикновено 3 пъти по 3 таблетки дневно.

Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.

Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!

Употреба при деца:

- от 3 до 6 год. възраст – по 1 таблетка до 3 пъти дневно

- при деца до 3 год. възраст – по ½ таблетка до 3 пъти дневно. Таблетката се стрива и се нанася от вътрешната страна на бузата.;

Ако сте приели повече от обичайната доза

Не се очаква неблагоприятен ефект, поради хомеопатичното разреждане на активните съставки

Ако сте пропуснали да приемете Лимфомиозот

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Лимфомиозот

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции

Макар и рядко могат да се появят алергични реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Лимфомиозот

Без специални условия на съхранение.



Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност – 5 години.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

- Какво съдържа Лимфомиозот

1 таблетка съдържа:

Активни вещества:

Araneus diadematus	D6	15 mg
Calcium phosphoricum	D12	15 mg
Equisetum hiemale	D4	15 mg
Ferrum iodatum	D12	30 mg
Fumaria officinalis	D4	15 mg
Gentiana lutea	D5	15 mg
Geranium robertianum	D4	30 mg
Juglans regia	D3	15 mg
Levothyroxinum	D12	15 mg
Myosotis arvensis	D3	15 mg
Nasturtium officinalis	D4	30 mg
Natrium sulfuricum	D4	15 mg
Pinus sylvestris	D4	15 mg
Sarsaparilla	D6	15 mg
Scrophularia nodosa	D3	15 mg
Teucrium scorodonia	D3	15 mg
Veronica officinalis	D3	15 mg

Помощни вещества:

Магнезиев стеарат

- Как изглежда и какво съдържа опаковката:

Бяла опаковка за таблетки от полипропилен с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия, заедно с листовка за пациента.

- Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

Phone: 0049 (0)7221 501 00, Fax: 0049 (0)7221 501 485

E-Mail: info@heel.com

- Дата на последно преразглеждане на листовката – 11.2021

