

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. № <u>20000403</u>	
Разрешение № <u>BG/44744-56798</u>	
Оборудване № <u>30.11.2021</u>	

Листовка: Информация за потребителя

Лимфомиозот перорални капки, разтвор
Lymphomyosot oral drops, solution

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Лимфомиозот и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Лимфомиозот
3. Как да използвате Лимфомиозот
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лимфомиозот
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Лимфомиозот и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Прилага се при лимфостазата (оток) от различен произход – следоперативна, посттравматична, статична; лимфаденити; тонзиларна хипертрофия и хроничен тонзилит.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Лимфомиозот

Не приемайте Лимфомиозот, ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта. Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 276 mg за доза (20 капки)(28 w/v), равно на 7 ml бира или 3 ml вино. Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия

Употреба на други лекарства

Не са известни лекарствени взаимодействия

Употреба на Лимфомиозот с храна, напитки и алкохол

Не са известни взаимодействия



Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Лимфомиозот не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Лимфомиозот

Ако не сте сигурни в начина на приложение, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При възрастни и деца над 6 год. възраст - обикновено 3 пъти по 15-20 капки дневно.

Употреба при деца:

- при деца от 2 до 6 год. възраст – по 8 капки 3 пъти дневно.
- при деца до 2 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно.

Ако симптомите продължат след приемането на хомеопатично лекарство повече от 7 дни да се направи консултация с лекар

Ако сте приели повече от обичайната доза

Не се очаква неблагоприятен ефект, поради хомеопатичното разреждане на активните съставки

Ако сте пропуснали да приемете Лимфомиозот

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Лимфомиозот

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции

Макар и рядко могат да се появят алергични реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уеб сайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



5. Как да съхранявате Лимфомиозот

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност – 5 години.

Срок на годност след първо отваряне – 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

- Какво съдържа Лимфомиозот

100 g съдържат:

Активни вещества:

Araneus diadematus	D6	5 g
Calcium phosphoricum	D12	5 g
Equisetum hiemale	D4	5 g
Ferrum iodatum	D12	10 g
Fumaria officinalis	D4	5 g
Gentiana lutea	D5	5 g
Geranium robertianum	D4	10 g
Levothyroxinum	D12	5 g
Myosotis arvensis	D3	5 g
Nasturtium officinalis	D4	10 g
Natrium sulfuricum	D4	5 g
Pinus sylvestris	D4	5 g
Scrophularia nodosa	D3	5 g
Smilax	D6	5 g
Teucrium scorodonia	D3	5 g
Veronica officinalis	D3	5 g

Съдържат 35 об.% алкохол

- Как изглежда и какво съдържа опаковката: Кафява стъклена бутилка с апликатор-капкомер и капачка на винт, съдържаща 30 ml разтвор, поставени в картонена кутия заедно с листовката за потребителя

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

Phone: 0049 (0)7221 501 00, Fax: 0049 (0)7221 501 485

E-Mail: info@heel.com

- Дата на последно преразглеждане на листовката –
11.2021

