

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Магнезиев Диаспорал 300 гранули за перорален разтвор

Magnesium Diasporal 300 granules for oral solution

Магнезиев цитрат (*Magnesium citrate*)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Магнезиев Диаспорал 300 и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Магнезиев Диаспорал 300
3. Как да приемате Магнезиев Диаспорал 300
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Магнезиев Диаспорал 300
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Магнезиев Диаспорал 300 и за какво се използва

Магнезиев Диаспорал 300 е минерална добавка на магнезий. Използва се при дефицит на магнезий, ако той предизвиква нарушения в мускулната активност (невромускулни разстройства, схващане на прасците).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Магнезиев Диаспорал 300**Не приемайте Магнезиев Диаспорал 300**

- ако сте алергични (свърхчувствителни) към магнезиев цитрат или към някоя от останалите съставки на Магнезиев Диаспорал 300;
- в случай на наличие на тежки бъбречни нарушения.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Магнезиев Диаспорал 300.

Други лекарства и Магнезиев Диаспорал 300

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства.

Аминогликозидни антибиотици, цисплатина и циклоспорин А ускоряват отделянето на магнезий. Магнезий, желязо, флуориди и тетрациклин си влияят взаимно на абсорбцията. Затова трябва да има интервал от 2 до 3 часа между приемането на Магнезиев Диаспорал 300 и препарати, съдържащи изброените вещества.



Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Магнезиев Диаспорал 300 може да се използва по време на бременност и в периода на кърмене без никакви притеснения.

Шофиране и работа с машини

Магнезиев Диаспорал 300 не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Магнезиев Диаспорал 300 съдържа захароза (захар) и натрий.

Този лекарствен продукт съдържа захароза (захар). Приемайте този лекарствен продукт само след консултация с Вашия лекар, ако Ви е известно, че страдате от непоносимост към определени видове захари.

Честата и постоянна употреба на Магнезиев Диаспорал 300 може да бъде вредна за зъбите (кариес) поради съдържащата се в лекарството захар.

Във всяко саше от този лекарствен продукт се съдържат 40 mg натрий (основна съставка на готварската сол). Това съответства на 2% от препоръчителния максимален дневен прием на натрий за възрастен.

3. Как да приемате Магнезиев Диаспорал 300

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Препоръчителната доза е едно саше на ден.

Ако сте приели повече от необходимата доза Магнезиев Диаспорал 300

Ако приемете повече от необходимата доза в случай на нормална бъбречна функция не може да се очаква интоксикация от магнезий.

Ако сте пропуснали да приемете Магнезиев Диаспорал 300

Не вземайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Магнезиев Диаспорал 300

Никакви последствия не се очакват.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В редки случаи ($\geq 1/10\,000$ до $< 1/1\,000$) лечението с Магнезиев Диаспорал 300 може да доведе до диария. За да се предотврати това, приемайте гранулите на малки порции при хранене или Магнезиев Диаспорал 100 таблетки за смучене.

За да се избегнат нежеланите лекарствени реакции терапията може да бъде временно прекъсната и да бъде продължена с намалена дозировка след подобрене и/или изчезване на симптомите.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев“ № 8,
1303 София,



тел.: +359 2 8903417,
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Магнезиев Диаспорал 300

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Магнезиев Диаспорал 300

Активното вещество е: магнезиев цитрат.
Едно саше (5 g) съдържа: магнезиев цитрат 1830 mg (16,2% Mg).
Съдържание на магнезий: 295,7 mg = 12 ммол = 24 mEq.

Другите съставки са: захароза, безводна лимонена киселина, натриев бикарбонат, рибофлавин (Е 101), овкусител (портокал).

Как изглежда Магнезиев Диаспорал 300 и какво съдържа опаковката

Магнезиев Диаспорал 300 представлява жълти гранули за перорален разтвор.
Предлага се в сашета от 5 g; по 20 сашета в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Protina Pharmazeutische Gesellschaft mbH
Adalperostrasse 37, 85737 Ismaning
Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката: Септември 2020

