

Бюджетна регистрация	9700562165
МЗА №	В6/М1/17б-71068-9
дата	24.04.2016

Листовка: информация за потребителя

Маркаин Спинал 5 mg/ml инжекционен разтвор
Marcaine Spinal 5 mg/ml solution for injection
 бупивакаинов хидрохлорид (bupivacaine hydrochloride)

Маркаин Спинал Хеви 5 mg/ml инжекционен разтвор
Marcaine Spinal Heavy 5 mg/ml solution for injection
 бупивакаинов хидрохлорид (bupivacaine hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате никакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признанията на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите никакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представляват Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви и за какво се използват
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Маркаин Спинал или Маркаин Спинал Хеви
3. Как да приемате Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представляват Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви и за какво се използват

Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви разтвори за инжектиране са локални анестетици за единократна употреба.

Маркаин Спинал 5 mg/ml е достъпен като ампули от 4 ml.


Маркаин Спинал Хеви 5 mg/ml е достъпен като ампули от 4 ml.

Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви се използват за анестезиране на част от тялото за хирургични операции, както и за обезболяване. Следователно най-важните приложения могат да бъдат описани както следва:

- за анестезиране на област от тялото, където ще се извършва операция;
- за осигуряване на обезболяване при раждане и след операция или тежка травма.

Маркаин Спинал 5 mg/ml, инжекционен разтвор и Маркаин Спинал Хеви 5 mg/ml, инжекционен разтвор се използват за обезболяване (анестезиране) на части от тялото по време на операция при възрастни и деца от всички възрастови групи.

Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви се инжектират в долната част на гръбначния стълб, когато е нужна анестезия на Вашите крака и долната част на тялото.



Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви действат чрез временно блокиране на болковата и температурната сензивност в областта на инжектиране. Понякога, Вие може още да изпитвате усещания за допир и натиск. По този начин, нервът(те) е(са) анестезиран(и) в тази част на тялото, където ще се извърши операция. В много случаи това означава, че нервите към мускулите в областта също ще бъдат блокирани, причинявайки временна слабост или парализа.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Маркаин Спинал или Маркаин Спинал Хеви

Не приемайте Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви:

- Ако сте алергични към бупивакаин хидрохлорид или някоя от другите съставки на Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви. Информирайте лекаря си, ако сте алергични към други сродни локални анестетици, тъй като това увеличава риска да сте алергични също и към Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви.
- Ако имате нарушения в кръвосъсирването или взимате лекарства за предотвратяване на кръвосъсирването.
- Ако страдате от някои заболявания, за които лекарят смята, че са противопоказани за употреба на Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви:

- За всяко заболяване, от което страдате и ако сърцето, черният дроб или бъбрешите Ви не функционират правилно.
- За лекарствата, които приемате редовно.

Други лекарства и Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви

Моля, информирайте Вашия лекар за други лекарства, дори непредписаните, които сте взимали напоследък или сте взимали за известно време, особено някои от следните: локални анестетици и лекарства за лечение на сърдечна аритмия могат да повлият на правилната доза на Маркаин.. Необходимо е Вашият лекар да знае за другите лекарства, за да изчисли точната доза.

Бременност, кърмене и фертилитет

Преди да приемете Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви, кажете на Вашия лекар ако сте бременна или се опитвате да забременеете.

Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви не са показвали вредни ефекти при употреба по време на бременността.

Преди да приемете Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви, кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви не са показвали вредни ефекти върху детето при употреба по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте и не работете с машини и инструменти в деня на операцията, защото Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви могат временно да повлият върху вашите реакции и мускулна координация.

3. Как да приемате Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви



Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви ще Ви бъде приложен от лекар. Дозата се преценява въз основа на клиничната необходимост и Вашето физическо състояние.

Употреба при деца и юноши

Маркаин Спинал 5 mg/ml инжекционен разтвор и Маркаин Спинал Хеви 5 mg/ml инжекционен разтвор се инжектират бавно в гръбначния канал (част от гръбначния стълб) от анестезиолог, с опит в педиатричните техники на анестезия. Дозировката зависи от възрастта и теглото на пациента и ще бъде определена от анестезиолога.

Ако сте приели повече от необходимата доза Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви
Сериозните странични ефекти при предозиране са много редки и изискват специално лечение.
Лекарят е обучен и разполага с необходимото оборудване за преодоляване на такива ситуации.

Рядък страничен ефект след спинална анестезия е високият или тотален спинален блок. За избягване на това, при пациенти в старческа възраст и тези в късен стадий на бременността се прилага по-ниска доза. Твърде високият блок може да доведе до задух, понижено кръвно налягане и намалена сърдечна честота.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много чести (повече от 1 на 10 души)	Понижено кръвно налягане, намалена сърдечна честота, чувство за гадене
Чести (по-малко от 1 на 10 и повече от 1 на 100 души)	Главоболие, повръщане, трудности при уриниране, изпускане на урина
Нечести (по-малко от 1 на 100 и повече от 1 на 1 000 души)	Усещане за боцкане, частична парализа, абнормални усещания, мускулна слабост, болка в гърба
Редки (по-малко от 1 на 1 000 души)	Сърдечен арест (спиране на механичната дейност на сърцето), алергични реакции, анафилактичен шок (тежка алергична реакция), временна анестезия на ръцете, краката и дихателните мускули, двустранна парализа, парализа, заболявания на нервната система, причиняване на инфекция на гръбначния канал, трудност при дишане

Кажете на Вашия лекар, колкото е възможно по-скоро, ако започнете да се чувствате зле по време на лечението с Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви.


Ако забележите някои неспоменати странични ефекти, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Допълнителни нежелани реакции при деца и юноши

Нежеланите лекарствени реакции при деца са подобни на тези при възрастни.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (вж. подробна информация по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



България

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

5. Как да съхранявате Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви

Обикновено Вашият лекар или лечебно заведение съхраняват Маркаин. Персоналът е отговорен за правилното съхраняване, употреба и изхвърляне на Маркаин.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Маркаин Спинал и Маркаин Спинал Хеви

Активното вещество е бупивакаинов хидрохлорид (bupivacaine hydrochloride).

Останалите съставки са:

- Маркаин Спинал: натриев хлорид, натриев хидроксид и/или хлороводородна киселина и стерилна вода за инжектиране.
- Маркаин Спинал Хеви: глукоза моногидрат, натриев хидроксид и/или хлороводородна киселина и стерилна вода за инжектиране.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:
Aspen Pharma Trading Limited,
3016 Lake Drive,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Ирландия
Tel.: +359 24 917 582

Производител:

Cepexi
52 Rue Marcel et Jacques Gaucher, 9
4120 Fontenay sous Bois
Франция
Corden Pharma, Otto-Hahn-Strasse 68723 Plankstadt, Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката: 12/2017

