

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. № 20050035	
Регистрационен № 86/1411746-57076	
Одобрение №	
17. 12. 2011	

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕВИТЕЛЯ

MASTODYNON tablets
МАСТОДИНОН таблетки

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, защото тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 6-8 седмици.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Мастодинон и за какво се използва
2. Преди да приемете Мастодинон
3. Как да приемате Мастодинон
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Мастодинон
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАСТОДИНОН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

За лечение при жени в случаи на:

- менструални нарушения;
- предменструален синдром с оплаквания като мастодиния, психична лабилност, констипация, појава на отоци, главоболие/мигрена;
- доброкачествено болезнено заболяване на гърдите (мастопатия).

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ МАСТОДИНОН

Не приемайте Мастодинон:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или някои други съставки на продукта.

Обърнете специално внимание при употребата на Мастодинон таблетки:

Ако симптомите са неясни, упорити или нови, трябва да се консултирате с лекар за отхвърляне на други причини за състоянието Ви.



Ако боледувате или сте боледували от естроген- зависими тумори трябва да се консултирате с лекуващия Ви лекар преди да приемете екстрактите от Vitex agnus castus, fructus.

Пациенти, които приемат някои лекарства, които влияят на продукцията на допамин (хормон на симпатиковата нервна система) или женски полови хормони, трябва да се съветват с лекуващия ги лекар, преди да приемат Мастодинон таблетки.

Пациенти, които страдат от разстройство на дейността на хипофизата, трябва да се консултират с лекар, преди да приемат този лекарствен продукт.

Не се препоръчва употребата на лекарствения продукт при деца под 12 години, поради липса на достатъчно опит с употребата му при деца. Мастодинон не трябва да се употребява преди началото на редовната менструация през пубертета.

Прием на Мастодинон с други лекарства:

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецепт.

Вследствие на възможното стимулиране на продукцията на допамин (хормон на симпатиковата нервна система) и на женските полови хормони от Vitex agnus castus, fructus някои изменения в действието на лекарствата, които действат по подобен начин, не могат да бъдат напълно изключени.

Прием на Мастодинон с храни и напитки:

В хомеопатичната терапия е известно, че обичайните вредни фактори като тютюнопушене и прием на алкохол оказват негативно влияние върху ефективността на хомеопатичния лекарствен продукт.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, попитайте Вашия лекар или фармацевт преди да приемете каквото и да е лекарство.

Мастодинон не трябва да се приема по време на бременност и кърмене. Опити с животни показват, че образуването на мляко се намалява.

Шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефекта върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Мастодинон таблетки:

Ако имате непоносимост към към някои захари, посъветвайте се с Вашия лекар преди да приемете този лекарствен продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ МАСТОДИНОН

Винаги приемайте Мастодинон точно както е описано в листовката: информация за потребителя. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако не е предписано друго от Вашия лекар, приемайте по една таблетка два пъти дневно с малко течност, сутрин и вечер.



В случай, че оплакванията се възобновят след преустановяване на приема на лекарствения продукт, посъветвайте се с лекувация Ви лекар преди да продължите лечението.

Колко време трябва да приемате Мастодинон?

За да се получи оптимален ефект от лечението, препоръчва се употребата да продължи повече от три месеца.

Ако симптомите продължат след редовната тримесечна употреба, необходимо е да се консултирате с лекар.

Не се препоръчва употребата на лекарствения продукт при деца и подрастващи под 12 години.

Какво трябва да предприемете, ако сте приемали по-голямо количество от Мастодинон таблетки?

Приемането на големи дози от лекарствения продукт може да предизвика стомашно-чревни неразположения или лаксативен ефект при лица с лактозна непоносимост.

Лечение: симптоматично.

Ако сте пропуснали да приемате Мастодинон

Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Мастодинон

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт ако сте спрели лечението.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт ако имате повече въпроси, отнасящи се до употребата на този лекарствен продукт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Мастодинон може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции са класирани съобразно тяхната честота в следните категории:

Много чести:	наблюдават се при повече от 1 на 10 пациенти
Чести:	наблюдават се при по-малко от 1 на 10 пациенти
Нечести:	наблюдават се при по-малко от 1 на 100 пациенти
Редки:	наблюдават се при по-малко от 1 на 1,000 пациенти
Много редки:	наблюдават се при по-малко от 1 на 10,000 пациенти
С неизвестна честота:	от наличните данни не може да бъде направена оценка

Честотата на следните възможни нежелани реакции не може да бъде определена от наличните данни:

- Тежки алергични реакции с оток на лицето, диспнея и затруднения в дишането
- (Алергични) кожни реакции (обрив и уртикария), акне
- Главоболие, виене на свят
- Стомашно-чревни неразположения (като гадене, коремна болка)
- Менструални нарушения



При първи признания на свръхчувствителност/алергична реакция Мастодинон не трябва да се приема отново.

Ако забележите някоя от тези нежелани реакции, преустановете приема на лекарствения продукт и се свържете с Вашия лекар.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНИВАТЕ МАСТОДИНОН

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Този продукт няма особени условия на съхранение.

Срок на годност

Срокът на годност е 4 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелян на опаковката!

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Мастодинон

1 таблетка съдържа:

Agnus castus D1	162.0 mg
Caulophyllum thalictroides D4	81.0 mg
Cyclamen D4	81.0 mg
Ignatia D6	81.0 mg
Iris D2	162.0 mg
Lilium tigrinum D3	81.0 mg

Помощни вещества: лактозаmonoхидрат, картофено нишесте, магнезиев стеарат.

Как изглежда Мастодинон и какво съдържа опаковката

Таблетки в опаковки по 60, 120 и 240 броя, по 20 броя таблетки в един блистер.

Производител и притежател на разрешението за употреба

Bionorica SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt

Германия

Тел.: 49 9181 /231-90

Факс: 49 9181 /231-265

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба в България:

Айкор България ЕООД

Бул. „Илиянци“ № 42, гр. София 1220, България

Тел.: +359885189691

Дата на последно одобрение на листовката: Октомври 2021 г.

