

Листовка: информация за пациента

Медролгин 0,5% капки за очи, разтвор
кеторолак трометамол

Medrolgin 0,5% eye drops, solution
ketorolac trometamol

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Залазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаките на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Медролгин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Медролгин
3. Как да използвате Медролгин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Медролгин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рев. №	20210066
Разрешение №	B6/171746-5375
Оголвение №	08. 03. 2021

1. Какво представлява Медролгин и за какво се използва

Името на Вашето лекарство е Медролгин 0,5% капки за очи, който е предназначен за приложение в окото. Като активно вещество съдържа 5 mg/ml кеторолак трометамол, който принадлежи към група лекарства, известни като нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Използва се при възрастни за профилактика и намаляване на възпалението и свързаните с него симптоми след операция на очите.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Медролгин

Не използвайте Медролгин:

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към кеторолак трометамол или някоя от останалите съставки на Медролгин (изброени в точка 6);
- ако сте алергични към аспирин или други подобни лекарства.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Медролгин.

Медролгин трябва да се използва с повищено внимание и след консултация с лекар ако имате или сте боледували в миналото от:

- вирусни или бактериални инфекции на окото;



- склонност към кървене (например анемия) или язви на стомаха;
- диабет;
- ревматоиден артрит;
- синдром на сухото око;
- астма след използване на НСПВС;
- скорошна операция на очите.

Деца

Медролгин не трябва да бъде предписан на деца.

Други лекарства и Медролгин

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт ако приемате, насърто сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително и такива отпускати без лекарско предписание.

Ако използвате други лекарства за очно приложение заедно с Медролгин, интервалът между отделните приложения трябва да бъде не по-малък от 5 минути.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Медролгин не трябва да се използва по време на бременност и кърмене, освен ако Вашият лекар не Ви препоръча това.

Шофиране и работа с машини

Скоро след прилагане Медролгин може да причини временно замъгляване на зрението. Не шофирайте и не използвайте машини, докато симптомите не отминат.

Медролгин съдържаベンзалкониев хлорид

Бензалкониевият хлорид може да причини дразнене на очите. Избягвайте контакт с меки контактни лещи. Отстранете контактните лещи преди прилагане и изчакайте поне 15 минути, преди да ги поставите обратно. Известно е, че бензалкониевият хлорид обезцветява меките контактни лещи.


3. Как да използвате Медролгин

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е 1 капка в засегнатото око (очи) 3 пъти дневно, започвайки 24 часа преди операцията и продължавайки до 3 седмици след операцията на очите. Важно е да се спазва хигиена при поставяне на капките. Не позволявайте върха на бутилката да се допира до окото, клепачите и околните повърхности, тъй като може да се замърси и това да доведе до развитието на очна инфекция със сериозни последствия за окото, дори до загуба на зрение. Винаги мийте ръцете си преди използване на бутилката!



Инструкции за употреба



Медролгин се накапва във всяко око по следния начин:

1. Измийте ръцете си преди да използвате лекарството. Наклонете главата си назад и погледнете към тавана (фиг. 1).
2. Дръпнете долния си клепач надолу, за да се образува малък „джоб“ между клепача и окото Ви (фиг. 2).
3. Обърнете бутилката надолу и я стиснете, докато капне една капка в засегнатото око/очи (фиг. 3).
4. Отпуснете долния си клепач и затворете окото/очите за 30 секунди (фиг. 4).

Ако не уцелите окото си, опитайте отново. Ако сте се накапали извън окото, избършете се с чиста кърпичка.

Затворете добре бутилката веднага след употреба.

Използвайте тази бутилка само за Вашите очи!

Ако сте използвали повече от необходимата доза Медролгин

Малко вероятно е приложението на по-високи дози да доведе до нежелани странични ефекти. Изплакнете окото/очите с хладка вода и се консултирайте с Вашия лекар. В случай на неволно погълдане на съдържанието на бутилката приемайте повече течности и потърсете съвет от Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да използвате Медролгин

Ако сте пропуснали доза, поставете капките веднага щом се сетите, освен ако не е дошло време за следващата доза, а след това продължете да ги използвате както преди. Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате тази, която сте пропуснали.

Ако сте спрели употребата на Медролгин

Ако имате въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Вие трябва да използвате Медролгин толкова дълго, колкото е назначено от лекаря.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



Вероятността от нежелани лекарствени реакции, свързани с роговицата (повърхността на окото) нараства, ако Медролгин се използва повече от две седмици или ако се използват и други локални стероидни капки по едно и също време. Трябва незабавно да се консултирате с Вашия лекар, ако почувствате болка в очите, повищено дразнене или промени в зрението.

Известни са следните нежелани реакции при употребата на Медролгин.

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на всеки 10 души)
Дразнене, смъдене, усещане за парене и болка в очите.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат от 1 до 10 на всеки 100 души)
Алергична реакция, подуване/подпухналост на очите и/или клепачите, сърбеж, зачеряване, инфекция или възпаление на окото, кръвоизлив в ретината, оток на централната част на ретината (светлочувствителната зона на окото), главоболие, случайно нараняване, причинено от върха на капкомера, докосващ окото, повищено очно налягане, замъглено и/или намалено зрение.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат от 1 до 10 на всеки 1000 пациенти)
Възпаление или увреждане на предния прозрачен слой на окото, сухота в очите и/или сълзящи очи.

Нежелани реакции с неизвестна честота (не може да бъде направена оценка от наличните данни)

Увреждане на повърхността на окото като изтъняване, ерозия, увреждане на повърхностния слой на роговицата, затруднено дишане или хрипове, влошаване на астма.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Медролгин

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета на бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след първо отваряне на бутилката: 4 седмици.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Когато не използвате Медролгин, съхранявайте бутилката в картонената кутия, за да я предпазите от светлина.



Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Медролгин

- Активното вещество в 1 ml разтвор е 5 mg кеторолак трометамол.
- Помощни вещества: октоксиол 40, динатриев едетат, натриев хлорид, бензалкониев хлорид, натриев хидроксид или концетрирана хлороводородна киселина (за корекция на pH), вода за инжекции.

Как изглежда Медролгин и какво съдържа опаковката

Медролгин капки за очи е бистра, безцветна до бледожълта течност, свободна от видими частици.

Опакован е в бяла непрозрачна LDPE бутилка от 5 ml с апликатор-капкомер от LDPE. Бутилката се затваря с бяла HDPE капачка на винт със защитен пръстен. Бутилката е поставена в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Ворлд Медисин Европа ЕООД
бул. Симеоновско шосе 130, ет. 3
1700 София
България

Производител

Ворлд Медисин Европа ЕООД
бул. „България“ № 110, вх. А, ап. 8
София 1618
България

Дата на последно преразглеждане на листовката

01/2021

