

ИЗДАНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНАТА ЛИСТОВКА	
Версия 2	
№ на Листовката	20011088
№ на Листовката	35561, 15-11-2016
Описание на	

Листовка: информация за пациента №

Мемоплант 40 mg филмирани таблетки

Сух стандартизиран екстракт от листа на Гинко билоба (35-67:1) (EGb761®)

Memoplant® 40 mg film-coated tablets

Ginkgo bilobae folium extractum siccum normatum (35-67:1) (EGb 761®)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Мемоплант 40 mg и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Мемоплант 40 mg
3. Как да приемате Мемоплант 40 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Мемоплант 40 mg
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Мемоплант 40 mg и за какво се използва

Лекарствен продукт, усилващ познавателната способност и циркулацията. Антидеменциално средство. Периферен вазодилататор.

Терапевтични показания

Мемоплант 40 mg се употребява:

- За симптоматично лечение при намаляване на интелектуалните способности, дължащо се на органичен мозъчен синдром в рамките на обща терапевтична схема в случай на прогресивно нарушение или загуба на паметови възможности (деменциален синдром), имащи като главни симптоми намалена памет, смущения в концентрацията, депресивно настроение, световъртеж, шум в ушите и главоболие.

Индивидуалното повлияване от лечението не може да се предвиди.

Преди да започне лечението с този продукт трябва да бъде изяснено дали болестните симптоми не се дължат на заболяване, което изисква специфично лечение.

- Удължаване на разстоянието, изминавано без болка, при заболявания със стесняване на периферните артериални съдове стадий II според Fontaine (интермитиращо накуцване) в рамките на физикално-терапевтичните мероприятия, особено при раздвижване.
- Световъртеж в резултат на циркулаторни нарушения или свързан с възрастта регресивен феномен (виене на свят от съдов и дегенеративен произход).
- Подпомагащо лечение при шум в ушите в резултат на циркулаторни нарушения или свързан с възрастта регресивен феномен (шум в ушите от съдов и дегенеративен произход)

Честата поява на световъртеж и шум в ушите винаги изисква изясняване от лекар. Ако настъпи внезапно намаляване или загуба на слуха, трябва незабавно да се консултирате с лекар.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Мемоплант 40 mg



Не приемайте Мемоплант 40 mg:

- ако сте алергични към гинко билоба или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Мемоплант 40 mg.

- При повишена склонност към кръвоизливи (хеморагична диатеза) или при едновременно приемане на лекарства, потискащи коагулацията, Мемоплант 40 mg трябва да се употребява само след консултация с лекар. Има единични съобщения за възможността препарати, съдържащи Гинко, да засилват склонността към кръвоизливи. Клиничните изследвания не дават каквито и да било доказателства за въздействие върху съсирваемостта на кръвта, но като предпазна мярка приемането на този продукт трябва да бъде спряно преди хирургически интервенции. Моля, уведомете Вашия лекар навреме, че употребявате Мемоплант 40 mg, за да може да прецени как да процедира.
- Ако страдате от епилепсия, моля, консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете лечение с Мемоплант 40 mg.

Деца и юноши

Това лекарство не бива да се употребява от лица под 18 г., поради липса на съответни показания за тази възрастова група.

Други лекарства и Мемоплант 40 mg

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Досега не са известни взаимодействия, имащи клинично значение.

Мемоплант 40 mg с храна, напитки и алкохол

Няма специални предупреждения.

Бременност, кърмене и фертилитет

Тъй като няма достатъчно проучвания, продуктът не трябва да се употребява по време на бременност и при кърмене. Не е известно дали съставките на екстракта се излъчват чрез кърмата.

Шофиране и работа с машини

Неприложимо

Мемоплант 40 mg съдържа лактоза монохидрат.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Мемоплант 40 mg

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

- За симптоматично лечение на понижена мозъчна функция, дължаща се на органичен мозъчен синдром:

Възрастни над 18 години да приемат 1-2 таблетки 3 пъти дневно.

- За удължаване на разстоянието, изминавано без болка, при заболявания със запушване на периферните артериални съдове:

Възрастни над 18 години да приемат 1 таблетка 3 пъти дневно или 2 таблетки 2 пъти дневно.

- В случай на световъртеж и шум в ушите от съдов или механичен произход:

Възрастни над 18 години да приемат 1 таблетка 3 пъти дневно или 2 таблетки 2 пъти дневно



Таблетките трябва да се приемат всяка сутрин, обед и вечер (3 пъти дневно) или всяка сутрин и вечер (2 пъти дневно).

Не приемайте таблетките в легнало положение. Таблетките трябва да се приемат несдъвкани с малко течност (за предпочитане с чаша вода). Приемът не зависи от храненето.

Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако имате впечатление, че действието на това лекарство е прекалено силно или прекалено слабо.

Продължителност на лечението

- За симптоматично лечение на деменция, дължаща се на органичен мозъчен синдром: Продължителността на лечение трябва да трае най-малко 8 седмици. След 3 месечен период на лечение, трябва да се провери от лекар дали по-нататъшния прием е оправдан.

- В случай на запушване на периферните артериални съдове:

За увеличаване на разстоянието, изминавано без болка, се изисква минимална продължителност на лечение от 6 седмици.

- В случай на световъртеж:

Приложение за период по-дълъг от 6 до 8 седмици не е изгодно като лечение.

- При шум в ушите:

Като помощно средство за лечение трябва да се приема най-малко 12 седмици. Ако не се наблюдава подобрене след 6 месеца, не може да се очаква по-нататъшно подобрене при по-дълъг период на лечение.

Употреба при деца

Мемоплант 40 mg не се препоръчва да се прилага при деца и юноши под 18 години.

Ако сте приели повече от необходимата доза Мемоплант 40 mg

Не е съобщавано за случаи на предозиране. Ако сте приели по-голямо количество Мемоплант 40 mg, нежеланите реакции, описани в т.4 "Възможни нежелани реакции", могат да се засилят. Моля, уведомете Вашия лекар, който ще прецени дали е необходимо да се вземат някакви мерки.

Ако сте пропуснали да приемете Мемоплант 40 mg

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Списъкът от нежелани реакции обхваща всички реакции, които са настъпили по време на лечение със сух екстракт от листа на Гинко билоба, включително и тези при по-високи дози или при продължителна употреба.

Няма потвърдени данни за честотата на нежеланите реакции, наблюдавани по време на лечение с продукти, съдържащи Гинко билоба, тъй като те са ставали известни чрез единични съобщения от пациенти, лекари и фармацевти. Според тези съобщения могат да настъпят следните нежелани реакции: главоболие, кръвоизливи от отделни органи, леки стомашно-чревни смущения, реакции на свръхчувствителност, включително алергични кожни реакции (зачервяване, оток, сърбеж).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.



Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. "Дамян Груев" № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Мемоплант 40 mg

Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия на съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Мемоплант 40 mg

- Активното вещество е: 40 mg Сух стандартизиран екстракт от листа Гинко билоба (*Ginkgo biloba L.*) (35-67:1) (EGb 761®). Екстрахиращ агент: ацетон 60% (m/m). Екстрактът се изразява количествено чрез 8,8 – 10,8 mg флавоноиди, калкулирани като флавон гликозиди и 2,16 – 2,64 mg терпенови лактони, от които 1,12 – 1,36 mg гинколиди А, В, С и 1,04 – 1,28 mg билобалид, и съдържа не повече от 0,2 µg гинколови киселини за една филмирана таблетка.
- Другите съставки (помощни вещества) са: кроскармелоза натриум, колоиден силициев диоксид, хипромелоза, лактоза монохидрат, макрогол 1500, магнезиев стеарат, царевично нишесте, микрокристална целулоза, диметикон – колоиден силициев диоксид- α-октадецил-ω-хидроксиполи (оксиетилен)-5- сорбинова киселина – вода (антиразпенваща емулсия SE 2 сухо вещество), талк, титанов диоксид Е 171, железен оксид Е 172.

Как изглежда Мемоплант 40 mg и какво съдържа опаковката

Мемоплант 40 mg е жълта, кръгла таблетка.

Съществува в оригинални опаковки по 20, 50 и 100 филмирани таблетки.

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe
Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Натурпродукт ООД,
Бул. Христофор Колумб №64
Тел.: 02/ 979 12 19

Дата на последно преразглеждане на листовката

