

Б. ЛИСТОВКА



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	
20030005	
Листовка: информация за потребителя	38471 / 07-07-2017
ПАНАДОЛ РАПИД 500 mg филмирани таблетки	

Парацетамол

PANADOL RAPIDE 500 mg film-coated tablets

Paracetamol

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява ПАНДОЛ Репид и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ПАНДОЛ Репид
3. Как да приемате ПАНДОЛ Репид
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ПАНДОЛ Репид
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ПАНДОЛ Репид и за какво се използва

ПАНДОЛ Репид облекчава болката при главоболие, включително мигрена, зъбобол, ревматични, мускулни и менструални болки.

ПАНДОЛ Репид облекчава неразположението при възпалено гърло и висока температура и при болки при простудни заболявания и грип.

Как действа ПАНДОЛ Репид?

ПАНДОЛ Репид съдържа парацетамол – аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата). Таблетките са специално разработени, така че парацетамол се абсорбира в кръвта най-малко два пъти по-бързо от стандартните таблетки с парацетамол.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ПАНДОЛ Репид

Не приемайте ПАНДОЛ Репид - ако сте алергични към парацетамол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).



Запомнете: ПАНАДОЛ Репид съдържа парацетамол.

Не приемайте с други лекарства, съдържащи парацетамол.

Важна информация относно някои от съставките на ПАНАДОЛ Репид:

Всяка таблетка съдържа 173 mg натрий. Не приемайте таблетките, ако сте на ниско солева диета.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете ПАНАДОЛ Репид, ако:

- имате бъбречно или чернодробно заболяване;
- взимате метоклопрамид, домперидон (използвани за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин;
- взимате антикоагуланти – лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
- трябва да взимате обезболяващи всеки ден за продължителен период. Въпреки това, може да приемате епизодично единични дози парацетамол за кратък период от време;
- сте имали проблем с дишането при употреба на това или подобно лекарство в миналото;
- сте бременна или кърмите;
очаквате високите дози натриев бикарбонат да предизвикат гастроинтестинални смущения, включително оригване и гадене. Високи дози натрий могат да доведат до хипернатриемия и това състояние трябва да бъде следено.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Епидемиологичните проучвания при бременност при човека не показват риск при употребата на парацетамол в препоръчаните дози.

Парацетамол се екскретира в майчиното мляко, но не в клинично значими количества.

Наличните данни не показват, че парацетамол е противопоказан по време на кърмене.

3. Как да приемате ПАНАДОЛ Репид

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

За перорално приложение.

Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години:

Една до две таблетки до четири пъти на ден, при необходимост.

Дозата да не се взима на интервали, по-кратки от 4 часа.

Възрастни: Да не се взимат повече от 8 таблетки (4000 mg парацетамол) за 24 часа.

Деца на и над 12 г.: Да не се взимат повече от 6 таблетки за 24 часа.

Деца под 12 години: Не се препоръчва при деца под 12 години.

Да не се надвишава препоръчаната доза.

Ако температурата се запази в продължение на 3 дни, а болката повече от 5 дни, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза ПАНАДОЛ Репид



Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре. Предозирането с парацетамол може да причини увреждане на черния дроб.

Ако сте пропуснали да приемете ПАНАДОЛ Репид

Приемете дозата, когато си спомните. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:

- наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето;
- се появят язви в устата;
- сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
- имате неочаквано кървене или склонност към насиняване.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

България

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

Уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ПАНАДОЛ Репид

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 30 °C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ПАНАДОЛ Рапид

Активното вещество е парацетамол 500 mg

Другите съставки (помощни вещества) са: натриев бикарбонат, разтворимо нишесте, повидон, царевично нишесте, калиев сорбат (E202), микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, восък карнауба, титаниев диоксид (E171), полидекстроза, хидроксипропил метилцелулоза, глицерол триацетат и полиетилен гликол.

Как изглежда ПАНАДОЛ Рапид и какво съдържа опаковката

ПАНАДОЛ Рапид са бели, овални, двойно изпъкнали таблетки със заоблени краища и делителна черта от едната страна.

Опаковката съдържа 10, 14 или 20 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited,
980 Great West Road
Brentford
Middlesex
TW8 9GS
Обединено кралство

Производител:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd,
Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ирландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, тел.02/953-10-34

Срок на годност: 3 години.

Без лекарско предписание.

Дата на последно преразглеждане на листовката

януари 2017

GSK logo и Panadol е търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

