

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Код ГСБ: №

2005 0546

ПЕРМИКСОН 160 mg твърди капсули

Разрешение №

86/МНП-58233

Сереноа репенс, липидостеролен маслен екстракт

14-03-2022

PERMIXON 160 mg capsules, hard

Одобрение №

Lipidosterolic extract of Serenoa repens

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Пермиксон и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Пермиксон
3. Как да използвате Пермиксон
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Пермиксон
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Пермиксон и за какво се използва

Пермиксон принадлежи към групата на лекарствените продукти, използвани при доброкачествена хипертрофия на простатата и действа на ниво простата за подобряване симптомите, свързани с доброкачествена хипертрофия на простатата.

Пермиксон се използва за лечение на средностепенни микционни нарушения, свързани с доброкачествена хипертрофия на простатата.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Пермиксон

Не използвайте Пермиксон

- ако сте алергични към активната съставка липидостеролен екстракт на Сереноа репенс или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Пермиксон

Употребата на това лекарство на празен стомах може да предизвика гадене и затова трябва да се приема по време на хранене.

Пермиксон не може да замести простатектомията и по време на лечението, трябва да бъдете под непрекъснато лекарско наблюдение.

Други лекарства и Пермиксон

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.



Не са наблюдавани никакви взаимодействия с други лекарства, често използвани за лечение на това заболяване (уринарни антибиотици, антисептици и противовъзпалителни средства).

За да се избегнат възможни взаимодействия между няколко лекарства, трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт за всички други лечения, които провеждате.

Пермиксон с храна и напитки

Препоръчително е Пермиксон да се приема по време на хранене с чаша вода без да се дъвче.

Бременност, кърмене и фертилитет

Този лекарствен продукт не е показан при жени.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не са наблюдавани ефекти върху способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате Пермиксон

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е по 1 капсула 2 пъти дневно по време на хранене с малко вода.

Употреба при деца и юноши

Този лекарствен продукт не е показан при деца и юноши.

Ако сте приели повече от необходимата доза Пермиксон

Появата на симптоми е свързана с преходни стомашно-чревни разстройства (коремна болка).

В случай на предозиране или случайно поглъщане, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Пермиксон

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Продължете лечението без промяна на дозата.

Ако сте спрели употребата на Пермиксон

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции, които могат да се появят са:

- Чести (засягат от 1 до 10 пациенти на 100)

- Главоболие,
- Коремна болка

- Не чести (засягат от 1 до 10 пациенти на 1000)

- Гадене
- Повишаване нивата на гама-глутамилтрансфераза, умерено повишаване на трансаминазите (чернодробните ензими).
- Зачервяване на кожата (обрив).
- Гинекомастия (доброкачествено увеличение на млечната жлеза при мъжете, обикновено след прекратяване на лечението).



- С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):
- Оток

Ако забележите някакви други нежелани реакции, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (вижте детайлите по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +359-28903417
уебсайт: www.bda.bg

5. Как да съхранявате Пермиксон

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 30°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Пермиксон

- Активното вещество е: Сереноа репенс, липидостеролен маслен екстракт от плодове (*Serenoa repens extractum fructus lipidosterolicum oleosum*)*.

- * Масленият екстракт е от плодовете на Сереноа репенс* (Bartram) Small.
- Съотношение на лекарствения екстракт 7-11:1
- Екстрахиращ разтворител: хексанов разтворител

- Другите съставки са: Макрогол 10 000, желатин, жълт железен оксид (E172), индиготин (E132), титаниев диоксид (E171).

Как изглежда Пермиксон и какво съдържа опаковката

Всяка опаковка Пермиксон съдържа 30, 60, 56 или 100 твърди капсули, в БУ Алуминиев блистер.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.



Твърдите капсули са бледо зелени и съдържат жълто-зелена смес.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

PIERRE FABRE MEDICAMENT

Les Cauquillous

81500 Lavaur

Франция

Производител

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION - PROGIPHARM

Rue du Lycée - 45 500 Gien

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката

02/2022

