

Б. ЛИСТОВКА

Листовка - Приложение 2

Към Рег. № 2004.04.06.

Разрешение №

БГ/4411/р-53065

20.01.2021

Одобрение №

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИТЕЛЕИ

Флебодия 600 mg филмирани таблетки
диосмин

Phlebodia 600 mg film-coated tablets
diosmin

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Винаги използвайте това лекарство, точно
както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия фармацевт или лекар

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите никакви нежелани реакции, уведомете Вашия фармацевт или лекар. Това
включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска
помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Флебодия 600 mg филмирани таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Флебодия 600 mg филмирани таблетки
3. Как да приемате Флебодия 600 mg филмирани таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Флебодия 600 mg филмирани таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФЛЕБОДИЯ 600 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Името на Вашето лекарство е Флебодия.

Този лекарствен продукт повишава тонуса на мускулите на стените на вените (венотоник) и
защитава малките кръвоносни съдове - капилярите, като увеличава устойчивостта им на
вредни влияния (васкулопротектор).

Флебодия трябва да се използва само при възрастни:

- в случай на проблеми с венозното кръвообращението (тежест в краката, болка, отпуснатост
на кожата при залежаване),
- за лечение на признаките на обострени хемороиди,
- за лечение на капилярна чупливост.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ФЛЕБОДИЯ 600 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ

Не приемайте Флебодия 600 mg филмирани таблетки

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към **някоя от останалите съставки** на този лекарствен продукт(описани в точка 6 на тази листовка),



Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Флебодия 600 mg филмирани таблетки.

Предупреждения и предпазни мерки

- Ако проблемите и чуplивостта на кръвоносните съдове не намалеят до 15 дни, обърнете се към Вашия лекар за съвет дали да продължите лечението.
- Ако оплакванията от хемороидите не намалеят няколко дни, след приема на Флебодия 600 mg филмирани таблетки., обърнете се към Вашия лекар за съвет.
- Флебодия 600 mg филмирани таблетки. има максимален ефект, когато си установите здравословни навици. Избягвайте излагането на слънце, топлината, продължителното стоеене прав, намалете наднорменото тегло. Ходенето пеша и носенето на специални чорапи подобрява кръвообращението,
- Прилагането на този лекарствен продукт не отменя специфичното лечение на някой анални заболявания

Други лекарства и Флебодия 600 mg филмирани таблетки.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насъкоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате да имате бебе, попитайте Вашия лекар или фармацевт за съвет, преди да приемате това лекарство.

Употребата на Флебодия 600 mg филмирани таблетки по време на бременност може да става само с предписание от лекар.

Тъй като няма известни данни дали този лекарствен продукт преминава в кърмата, при кърмене употребата на Флебодия 600 mg филмирани таблетки. не се препоръчва.

Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма описано влияние на този лекарствен продукт върху способността за шофирането или работа с машини.

Флебодия 600 mg филмирани таблетки. съдържа кохинил червено и пропилен гликол
Наличието на кохинил червено и пропилен гликол може да причини алергични реакции или дразнене по кожата.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ФЛЕБОДИЯ 600 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Приемайте Флебодия 600 mg филмирани таблетки. перорално (през устата), с чаша вода.

Ако лекарят не е назначил друго, се препоръчва:

При венозна недостатъчност: 1 таблетка дневно по време на хранене,

При хемороиди: 2 до 3 таблетки дневно по време на хранене.



Ако сте пропуснали да приемете Флебодия Флебодия 600 mg филмирани таблетки.

- Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛANI РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Флебодия 600 mg филмирани таблетки. може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 человека) – stomашна болка;

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 человека) –

- алергични реакции като обрив, сърбеж (пруритус), сърбящ обрив (копривна треска), подуване на лицето и гърлото;
- подуване на корема;
- диария;
- трудно храносмилане;
- гадене.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души):

- повръщане.

Храносмилателни проблеми са леки, като рядко се налагат спиране на лечението.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

България

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФЛЕБОДИЯ 600 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Флебодия 600 mg филмирани таблетки. след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Флебодия 600 mg филмирани таблетки.

- Активното веществаво е: диосмин.

Всяка филмирана таблетка съдържа 600 mg диосмин.

Другите съставки са:

талк, колоиден хидрофобен силициев диоксид, микронизирана стеаринова киселина, микрокристална целулоза.

Филмово покритие: хипромелоза, микрокристална целулоза, макрогол стеарат 400, пропилен гликол, титанов диоксид, кохинеален червен А, черен железен оксид, червен железен оксид, карнауба въськ, пчелен въськ, шеллак, етанол 95 °.

Как изглежда Флебодия 600 mg филмирани таблетки. и какво съдържа опаковката

Флебодия се предлага под формата на филмирани таблетки в PVC/ алуминиев блистер по 15 таблетки. Блистерите са поставени в картонена кутия по 1 или 2 блистера, т.е. по 15 или 30 филмирани таблетки.

Не всички крайни опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба:

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL

22 Avenue Aristide Briand

94110 ARCUEIL - Франция

Производител:

INNOTHERA CHOUZY

Rue Rene Chantereau –

Chouzy-sur-Cisse

41150 VALLOIRE-SUR-CISSE - Франция

Представителството за България

1113 София, ж.к. "Изток", ул. "Асен Пейков", бл. 36 А, вх. Б, ап. 5

тел.: 02/ 87 00 462,

e-mail: innotech_bulgaria@cablebg.net

Дата на последно преразглеждане на листовката 04/ 2020

