

Листовка: информация за потребителя

ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории

Трибенозид/Лидокаин

PROCTO-GLYVENOL 400 mg/40 mg suppositories

Tribenoside/Lidocaine

13-11-2019

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 1 седмица не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории
3. Как да използвате ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории и за какво се използва

ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории се използва за локално лечение на външни и вътрешни хемороиди. Хемороидите представляват подуване на вените в областта на ректума или ануса, които предизвикват болка, смъдене и сърбеж.

Как ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории действа

Активно действащите вещества в състава на лекарствения продукт оказват своя лечебен ефект, както следва:

Първата активна съставка трибенозид действа локално върху причинителите на възпалението в малките кръвоносни съдове.

Втората активна съставка лидокаин или неговата сол, лидокаинов хидрохлорид, е локален анестетик, който незабавно облекчава болката, сърбежа и паренето, причинени от хемороидите. Ако след една седмица не се чувствате добре или състоянието Ви се влоши трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории

Не използвайте ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или някоя от останалите съставки на ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории (изброени в края на точка 2).

Предупреждения и предпазни мерки



Трябва да се избягва контакт с очите. Ако това се случи, изплакнете очите обилно с чиста вода. Ако дискомфортът продължи, потърсете лекарска помощ.

Продуктът не трябва да се поглъща.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории, ако страдате от чернодробно нарушение.

Деца

Не използвайте ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории при деца и юноши под 18 години, без да се консултирате с Вашия лекар. Няма клинични данни за употребата на ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории при деца.

Други лекарства и ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории

Няма сведения за взаимодействие на ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории с други лекарствени продукти.

В случай че приемате бета-блокери или други антиаритмични лекарства (използвани за лечение на високо кръвно налягане или отклонения от сърдечния ритъм), преди да приложите този лекарствен продукт се консултирайте с Вашия лекар.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории не би трябвало да оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории

Винаги използвайте ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Когато симптомите са остри:

Поставяйте 1 супозитория два пъти дневно (сутрин и вечер).

Когато симптомите намалееат:

Използвайте 1 супозитория веднъж дневно.

Не превишавайте препоръчаната доза.

Избягвайте всякакъв контакт с очите.

Не поглъщайте ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории.

Продължителност на лечението:

Използвайте ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории до пълното изчезване на симптомите.

Ако симптомите продължат повече от една седмица, консултирайте се с Вашия лекар.

Начин на приложение

1. Вземете една супозитория от опаковката, като я откъснете от лентата.
2. Старателно измивайте ръцете си преди и след употреба.
3. Почистете засегнатата зона и нежно подсушете с хартиена или мека кърпа преди да приложите супозиторията.



4. Приложете посредством нежно поставяне на една супозитория в ануса, така че да не стърчи и я оставете вътре.
5. Не използвайте вазелин или олио като лубрикант.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории

Няма известни данни за предозиране с ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории. Въпреки това, ако сте използвали повече от необходимата доза ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории, моля, консултирайте се веднага с Вашия лекар или фармацевт.

Ако по погрешка погълнете ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории, свържете се веднага с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да използвате ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории

Ако сте пропуснали доза ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории, не се притеснявайте. Приложете следващата доза ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории в обичайното време. Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои от нежеланите реакции са много редки (могат да засегнат по-малко от 1 на всеки 10000 човека).

В много редки случаи може да причини тежки алергични реакции (анафилактични реакции). Спрете употребата на лекарствения продукт и се свържете незабавно с Вашия лекар, ако получите някои от изброените симптоми, които могат да бъдат знак за алергична реакция.

- Хрипове, затруднено дишане или преглъщане, усещане за стягане в областта на гърдите.
- Подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото.
- Силен кожен сърбеж с червен обрив или изразени мехури.

Някои от нежеланите реакции са редки (могат да засегнат между 1 на всеки 1000 човека).

ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории като цяло се понася добре. Въпреки всичко, в редки случаи може да предизвика кожни реакции като парене, сърбеж или зачервяване на мястото на прилагане или дори да обхване съседни зони. Консултирайте се с Вашия лекар, ако имате някои от тези симптоми.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка, нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

България
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории



Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории при температура под 25°C в оригиналната опаковка.

Не използвайте ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории

Активни вещества са: трибенозид и лидокаин.

Другите съставки (помощни вещества) са: твърда мас №1 (Witepsol E85) и твърда мас №2 (Witepsol W35).

Как изглежда ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории и какво съдържа опаковката
ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ 400 mg/40 mg супозитории са жълтеникавобели супозитории с формата на торпедо, опаковани в ламинирано с полиетилен и полипропилен алуминиево фолио.
Опаковка: 10 супозитории.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited, Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ирландия

Производител:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 München, Германия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, тел.02/953-10-34

Дата на последно преразглеждане на листовката

януари 2019

