

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Профикс® 250 mg/5 ml прах за перорална суспензия  
Profix® 250 mg/5 ml powder for oral suspension  
цефпрозил (cefprozil)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че призначите на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Profix® и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Profix®
3. Как да приемате Profix®
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Profix®
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	Л0170203
Към Рев. № .....	Б6/НМ/ГР-58943
Разрешение № .....	Одобрение № .....
18 -05- 2022	

### 1. Какво представлява Profix® и за какво се използва

Профикс® съдържа активното вещество цефпрозил като цефпрозил моногидрат.

Профикс® 250 mg/5 ml прах за перорална суспензия съдържа 250 mg цефпрозил в 5 ml от пероралната суспензия.

Профикс® е полусинтетичен, широкоспектърен цефалоспоринов антибиотик.

Профикс® се използва за лечение на инфекции причинени от бактерии, които са чувствителни към цефпрозил.

Профикс® се използва за лечение на:

- Инфекции на горните дихателни пътища – синузит, фарингит, тонзилит;
- Остър и среден отит при деца;
- Инфекции на долните дихателни пътища, включително бронхит и пневмония;
- Неусложнени инфекции на кожата и меките тъкани – абцеси, язви, инфицирани рани, целулит – при възрастни и деца над 13 годишна възраст;
- Неусложнени инфекции на пикочните пътища, включващи остръ цистит.

### 2. Какво трябва да знаете, преди да приемате Profix®

#### Не приемайте Profix®:

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към цефпрозил или към някоя от съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към антибиотици от класа на цефалоспорините (напр. цефалексин);



## **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Профекс®:

- ако сте алергични към цефпрозил, пеницилини, цефалоспорини или други лекарства;
- ако повръщате или имате диария;
- ако страдате или сте имали бъбречно или чернодробно заболяване, колит или стомашни проблеми;
- ако Ви предстои операция, включително и стоматологична операция;
- ако сте бременна, планирате бременност или кърмите;
- ако Ви предстоят лабораторни изследвания, тъй като Профекс® може да причини промяна в резултатите на някои тестове.

## **Други лекарства и Профекс®**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, насърто сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате:

- други антибиотици, например амикacin, гентамицин, канамицин, неомицин, паромомицин, стрептомицин, тобрамицин;
- отводняващи лекарства (диуретици);
- витамини;
- противостърсирващи средства (антикуаголанти).

## **Профекс® с храна, напитки и алкохол**

Приемът на храна не повлиява действието на Профекс®.

Профекс® може да се приема със или без храна.

## **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

## **Бременност**

Лечение с Профекс® по време на бременност може да се приложи само в случаите, когато Вашия лекар е преценил, че е наложително.

Вашия лекар ще прецени ползите и рисковете за Вас и Вашето бебе.

## **Кърмене**

Лечението на кърмещи жени с Профекс® трябва да се провежда с повишено внимание.

Цефпрозил може да премине в кърмата и да навреди на Вашето бебе.

## **Шофиране и работа с машини**

Употребата на Профекс® може да е причина за поява на умора или замаяност.

Ако се чувствате така, не шофирайте, не използвайте никакви инструменти или машини.

Ограничете алкохолните напитки.

## **Профекс® съдържа:**

- Захароза – може да увреди зъбите;
- Аспартам – източник на фенилаланин и може да е вреден за хора с фенилкетонурия;
- Макроголглицерол хидроксистеарат – може да причини стомашно разстройство.



### **3. Как да приемате Профакс®**

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Профакс® перорална суспензия е подходящ за употреба при деца на възраст от 6 месеца до 12 години, за лечение на инфекции причинени от чувствителни към цефпрозил бактерии.  
Обичайната дневната доза Профакс® зависи от вида на бактериалната инфекция:

#### **Възрастни и деца над 12 години**

##### **Инфекции на горните дихателни пътища**

<b>Фарингити, тонзилити</b>	<b>500 mg на 24 часа</b>	<b>10 дни*</b>
<b>Синузит</b>	<b>500 mg на 12 часа или 250 mg на 12 часа</b>	<b>10 дни</b>
<b>(При умерена до тежка инфекция трябва да се използва по-висока доза)</b>	<b>500 mg на 12 часа</b>	

##### **Инфекции на долните дихателни пътища**

<b>Вторични бактериални инфекции на бронхите и хронични бронхити</b>	<b>500 mg на 12 часа</b>	<b>10 дни</b>
--	--------------------------	---------------

##### **Инфекции на кожата и меките тъкани**

<b>Неусложнени инфекции на кожата и меките тъкани</b>	<b>250 mg на 12 часа 500 mg на 24 часа или 500 mg на 12 часа</b>	<b>10 дни</b>
---	--	---------------

<b>Неусложнени инфекции на никочните пътища</b>	<b>500 mg на 24 часа</b>	<b>10 дни</b>
---	--------------------------	---------------

#### **Деца от 2 до 12 година възраст**

##### **Инфекции на горните дихателни пътища\*\***

<b>Фарингити, тонзилити</b>	<b>7,5 mg /kg на 12 часа</b>	<b>10* дни</b>
-----------------------------	------------------------------	----------------

##### **Инфекции на кожата и меките тъкани \*\***

<b>Неусложнени инфекции на кожата и меките тъкани</b>	<b>20 mg/kg на 24 часа</b>	<b>10 дни</b>
---	----------------------------	---------------

#### **Бебета и деца (от 6 месеца до 12 година възраст)**

##### **Инфекции на горните дихателни пътища\*\***

<b>Среден отит</b>	<b>15 mg/kg на 24 часа</b>
--------------------	----------------------------



Синузит (При умерена до тежка инфекция трябва да се използва по-висока доза)	7,5 mg /kg на 12 часа 15 mg/kg на 12 часа	10 дни
---	--	--------

\* - лечението на инфекции причинени от *Streptococcus pyogenes* с Профекс® трябва да продължи поне 10 дни

\*\* - да не се превишава препоръчителна доза при възрастни

Продължителността на лечението е от 7 до 10 дни.

Безопасността и ефективността на Профекс® при деца под 6 месечна възраст не е установена. За възрастни и деца над 12 години е подходящо използването на Профекс® таблетки. Опитвайте се да приемате Профекс® по едно и също време всеки ден. Приемът на Профекс® не зависи от приема на храна.

#### Указания за приготвяне на пероралната суспензия

- Отворете бутилката
- Добавете преварена и охладена вода, приблизително до половината на бутилката
- Затворете бутилката и разкларате до разтваряне на праха за перорална суспензия
- Изчакайте няколко минути, добавете вода до маркировката и отново разкларате енергично

Приготвената по този начин суспензия трябва да се съхранява в хладилник и има срок на годност 14 дни.

Вместимост на мерителната лъжичка – 5 ml суспензия.

#### Ако сте приели повече от необходимата доза Профекс®

Ако сте приели повече от необходимата доза Профекс® незабавно се свържете с Вашия лекар.

#### Ако сте пропуснали да приемете Профекс®

Ако сте пропуснали да приемете Профекс®, вземете обичайната доза веднага щом се сетите, освен ако не е много близо до следващата доза. Ако това се случи, пропуснете приема и вземете следващата доза, като следвате предписаното Ви лечение.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

#### Ако сте спрели приема на Профекс®

Не спирайте лечението преди да сте завършили пълния курс на лечение, независимо, че сте се почувствали по-добре. Възможно е някои от симптомите да се проявят отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Профекс® може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В тази листовка, когато нежеланите реакции са описани като „чести”, това означава, че те са съобщавани при повече от 1 на всеки 10 пациенти, но при по-малко от 1 на всеки 10 пациенти.



Когато нежеланите реакции са описани като „нечести”, това означава, че те са съобщавани при повече от 1 на всеки 1 000 пациента, но при по-малко от 1 на всеки 100 пациента.

Когато нежеланите реакции са описани като „редки”, това означава, че те са съобщавани при повече от 1 на всеки 10 000 пациента, но по-рядко от 1 на всеки 1 000 пациента.

Когато нежеланите реакции са описани като „много редки”, това означава, че те са съобщавани при по-малко от 1 на всеки 10 000 пациента.

**Чести:** инфекция с нечувствителни към антибиотика микроорганизми, гъбична инфекция на влагалището, световъртеж, увеличение на белите кръвни клетки в кръвта, болки в корема, диария, гадене, повръщане, завишени резултати от лабораторни тестове за изследване на чернодробната функция

**Нечести:** намален брой бели кръвни клетки, объркване, безсъзнание, сънливост, нервност, главоболие, обрив, уртикария (копривна треска)

**Редки:** намален брой кръвни плоочки (тромбоцити), затруднено съсиране на кръвта, ангиоедем (оток на лицето, клепачите, езика, гърлото), колит (включително псевдомемброзен), покълтяване на кожата и склерите, тежки кожни реакции с образуване на мехури по кожата и лигавиците, генитален съrbеж, повишена температура

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ):  
ул. „Дамян Груев“ № 8  
гр. София 1303,  
тел. +359 2 8903417  
ел. поща: [bda@bda.bg](mailto:bda@bda.bg)  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## 5. Как да съхранявате Профекс®

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелаязан върху картонената опаковка.  
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след разтваряне - 14 дни.

След разтваряне да се съхранява в хладилник при температура от 2°- 8°C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



## **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

### **Какво съдържа Профекс®**

- Активното вещество е: цефпрозил
- Другите съставки са: микрокристална целулоза, кармелоза натрий, кросповидон, макроголглицерол хидроксистеарат, захароза, глицин, аспартам, безводна лимонена киселина, безводен колоиден силициев диоксид, натриев бензоат, натриев хлорид, аромат (банан), подобрител на вкуса .

### **Как изглежда Профекс® и какво съдържа опаковката**

Профекс® 250 mg/5 ml прах за перорална суспензия е жълтеникаво- бял прах.

Всяка опаковка съдържа стъклена бутилка, с кехлибарен цвят, с капачка на винт и пластмасова мерителна лъжичка с вместимост 5 ml.

### **Видове опаковки:**

Бутилка с вместимост 75 ml съдържаща 30 g прах за перорална суспензия (60 ml суспензия).

Бутилка с вместимост 125 ml съдържаща 50 g прах за перорална суспензия (100 ml суспензия).

### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

**НОБЕЛ ФАРМА ЕООД**

Околовръстен път № 36

София 1415, България

**Дата на последно преразглеждане на листовката: 04.2022 г.**

