

Проспан Ликвид 7 mg/ml перорална течност

Сух екстракт от листа на боровинка

Prospan Liquid 7 mg/ml oral liquid
Hedera helix folium extractum siccum

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Проспан Ликвид и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Проспан Ликвид
3. Как да използвате Проспан Ликвид
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Проспан Ликвид
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Проспан Ликвид и за какво се използва

Проспан Ликвид е перорална течност.

Проспан Ликвид се използва за симптоматично лечение на: хронични възпалителни бронхиални заболявания и остри възпаления на дихателните пътища, придружени с кашлица.

Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Проспан Ликвид**Не използвайте Проспан Ликвид**

- ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Проспан Ликвид.

Ако оплакванията продължават или се појви задух, температура, както и гнойни или кървати храчки, се налага незабавна консултация с лекар.

Проспан Ликвид не е подходящ за деца под 6 годишна възраст.

Други лекарства и Проспан Ликвид

До момента не са известни взаимодействия между Проспан Ликвид и други лекарствени продукти. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Поради липсата на данни за безопасността по време на бременност и кърмене, продуктът не трябва да се употребява в този период.

Шофиране и работа с машини Няма.

Проспан Ликвид съдържа сорбитол.

Ако се използва според указанията за дозиране всяка доза от Проспан Ликвид съдържа до 1,9 g сорбитол.

Съществува рисък за пациентите с вродена непоносимост към фруктоза.

В такива случаи лечението трябва да се провежда само след консултация с лекар.

3. Как да използвате Проспан Ликвид

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни и деца над 12 годишна възраст приемат по 1 пакетче (5 ml) три пъти дневно. Дневната доза (15 ml) съответства на 105 mg сух екстракт от листа на бършлян.

Деца от 6 до 11 годишна възраст приемат по 1 пакетче (5 ml) два пъти дневно. Дневната доза (10 ml) съответства на 70 mg сух екстракт от листа на бършлян.

Начин на приложение

Проспан Ликвид се приема сутрин, (по обяд) и вечер.

Леко разклатете пакетчето преди да го отворите.

След отварянето изсипете цялото количество от течността директно в устата.

Продължителност на лечението

Продължителността на лечението зависи от вида и тежестта на симптомите, но трябва да продължи поне една седмица, дори и при леки възпаления на дихателните пътища.

За да има лечението траен успех, то трябва да продължи 2-3 дни след отзучаване на симптомите.

Ако имате съмнения, че ефектът на Проспан Ликвид е твърде силен или слаб, моля посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Проспан Ликвид

Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Приемането на значително високи количества (3 пъти дневната доза) може да предизвика гадене, повръщане и диария.

Незабавно се консултирайте с Вашия лекар, ако сте приели по-голяма доза Проспан Ликвид.

Ако сте пропуснали да приемете Проспан Ликвид

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Вместо това приемайте нормална доза в обичайното време.

4. Възможни нежелани реакции



Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За оценяване на нежеланите лекарствени реакции е използвана следната класификация

Много чести	(≥ 1/10)
Чести	(≥ 1/100 до < 1/10)
Нечести	(≥ 1/1 000 до < 1/100)
Редки	(≥ 1/10 000 до < 1/1 000)
Много редки	(< 1/10 000)
С неизвестна честота	(от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Много рядко

Могат да възникнат алергични реакции като задух, оток, зачеряване на кожата и сърбеж след приемането на лекарства, съдържащи бършлян.

Нечесто

При пациенти с повишена чувствителност могат да възникнат стомашно-чревни оплаквания като гадене, повръщане и диария.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (вижте детайлите по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна Агенция по Лекарствата

София 1303, ул. Дамян Груев 8
Тел.: +359-28903417
Уебсайт: www.bda.bg

5. Как да съхранявате Проспан Ликвид

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелаян върху опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Поради съдържанието на растителен екстракт в Проспан Ликвид е възможно да се наблюдава леко помътняване на разтвора или минимални промени във вкуса. Това обаче, не повлиява терапевтичната ефективност на продукта.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Проспан Ликвид

- Активното вещество е сух екстракт от листа на бършлян (*Hedera helix folium extractum siccum*)
1 ml сироп съдържа: 7 mg сух екстракт от листа на бършлян (5-7.5:1)
Извличащо средство: етанол 30% (об/об)
- Другите съставки са: калиев сорбат (консервант), безводна лимонена киселина, ксантанова гума, течен сорбитол 70% (кристиализиращ), аромат, ментол, пречистена вода.
5 ml от течността съдържа 1,926 g сорбитол = 0,16 хлебни единици.

Как изглежда Проспан Ликвид и какво съдържа опаковката
Проспан Ликвид се предлага в пакетчета от 5 ml.



21 пакетчета в опаковка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstrasse 3
61138 Niederdorfelden
Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Ведра Интернешънъл АД
София 1407

Дата на последно преразглеждане на листовката 12 /2014

