

Преди употреба внимателно прочетете написаното в листовката

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА

ПАЦИЕНТА 11-5338/08.07.09

Към РУ №:

Одобрено:

N= 5/25.05.09

**1. RIVANOL GALEN – PHARMA 1% ointment ; Ethacridine lactate monohydrate
РИВАНОЛ ГАЛЕН – ФАРМА 1% маз; Етакридинов лактат монохидрат**

*** Активно вещество:**

Етакридинов лактат монохидрат (*Ethacridine lactate monochydrate*)

*** За какво се използва Риванол Гален Фарма 1% маз - Маз, за дермално приложение.**

Rivanol има антимикробно действие при инфекции предизвикани от коки и особено стрептококи. Приложен дори в ниски концентрации той запазва ефективността на действието си, но без да потиска фагоцитозата и без да дразни тъканите.

2. ПОКАЗАНИЯ: за лечение на рани, кожни повърхностни язви, пиодермии, вторични инфектирани дерматози и изгаряния. Намира приложение основно в хирургията, гинекологията, урологията и дерматологията.

3. ПРЕДИ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА РИВАНОЛ ГАЛЕН – ФАРМА 1% маз

*** Противопоказания- не използвайте РИВАНОЛ ГАЛЕН – ФАРМА 1% маз:**

Ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките и контактна алергия към акридинови багрила.

*** Необходими предпазни мерки при употреба:**

При бременни и кърмачки, продуктът следва да се прилага с повишено внимание.

*** Прием на други лекарства:**

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

*** Специални предупреждения:**

Препаратът е само за външна употреба!

Да се пазят очите!

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

*** Шофиране и работа с машини :**

Няма данни за неблагоприятен ефект върху способността за шофиране и работа с машини.

4. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Само за прилагане върху кожата (Cutaneous use).

*** Начин на употреба:** Външно, за мазане. Прилага се на тънък слой върху засегнатото място. Образува се филм, който играе ролята на защитна превръзка. Превръзката се сменя на 24-36 часа след предварително почистване.

*** При липса на ефект или влошаване на състоянието да се потърси съвет на лекар!**

*** Предозиране**

Макар и рядко, по-продължителното приложение може да причини иритативни и корозивни увреждания на кожата.

*** Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.**



5. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Контактни алергични дерматити. Фотосенсибилизация и по-рядко уртикария, отоци, главоболие.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

6. СРОК НА ГОДНОСТ, СЪХРАНЕНИЕ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РИВАНОЛ ГАЛЕН – ФАРМА 1% маз

* Срокът на годност на продукта е 18 /осемнадесет/ месеца.

* Не използвайте Риванол Гален Фарма 1% маз след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

* Да се съхранява на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25 °С, в оригинални опаковки.

* Не използвайте продукта, ако забележите промяна във външния вид.

*** Какво съдържа Риванол Гален Фарма 1% маз?**

Активно вещество:

Етакридинов лактат (*Ethacridine lactate*), като Етакридинов лактат монохидрат (*Ethacridine lactate monohydrate*) – 0,150g в 15g.

Помощни вещества:

бял вазелин (Paraffin white soft)

* Една опаковка съдържа 15g Риванол Гален Фарма 1% маз.

*** Производител и притежател на разрешението за употреба**

„ГАЛЕН ФАРМА” ООД

с. Калугерово, обл. Пазарджик

България

Дата на последна редакция на текста: март 2008 г.

