

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**Сарженор 1 g ефервесцентни таблетки
Аргинин аспартат**

**Sargenor® 1 g effervescent tablets
Arginine aspartate**

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 15 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

В тази листовка:

1. Какво представлява Сарженор и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Сарженор
 3. Как да приемате Сарженор
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Сарженор
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА | |
| Листовка - Приложение 2 | 98 00 195 |
| Към Рег. № | 86/144746-60416 |
| Разрешение № | 03 - 10 - 2022 |
| Одобрение № | |

1. Какво представлява Сарженор и за какво се използва

Сарженор ефервесцентни таблетки е тонизиращ лекарствен продукт, който се използва за краткотрайно симптоматично лечение на умора.

Ако след 15 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Преди да приемете Сарженор

Не приемайте Сарженор

- ако сте алергични към активното вещество или някоя от останалите съставки на Сарженор ефервесцентни таблетки изброени в точка 6.

Ако се колебаете, моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или, фармацевт, преди да приемете Сарженор.

Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към фруктоза не трябва да приемат това лекарство.

При пациенти с скорошен инфаркт на миокарда, този лекарствен продукт трябва да се приема само под лекарско наблюдение.

Деца и юноши

При появя на умора при деца под 12 години, дори и при краткотрайна продължителност, трябва да се консултирате с лекар.

Всяка ефервесцентна таблетка от лекарствения продукт съдържа 4,35 mmol (или 100 mg) натрий на доза. Това трябва да се има предвид при пациенти на диета с контролиран прием на натрий. Този лекарствен продукт съдържа азо багрило (Сънсет жълто FCF, Е 110), кое може да причини алергични реакции.



Ако умората продължава след 15-я ден или ако забележите необичайни ефекти, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт!

При всеки случай на колебание, Вие трябва да потърсите съвет от Вашия лекар или фармацевт!

Други лекарства и Сарженор

За да избегнете възможни лекарствени взаимодействия, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насъкоро сте приемали, или е възможно да приемате други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

Този лекарствен продукт съдържа аргинин аспартат (комбинация от две аминокиселини). Тези аминокиселини се съдържат и в други лекарства. За да се избегне евентуално предозиране, е препоръчително такива лекарства да не се приемат едновременно.

Сарженор с храна, напитки и алкохол

Приемът на това лекарство не Ви освобождава от необходимостта да водите здравословен начин на живот – редовни физически упражнения, добре балансирана диета (главно избягвайте употребата на алкохол, никотин и/или стимуланти), редовен сън, почивка.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не се препоръчва употребата на Сарженор перорален разтвор по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Сарженор не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Сарженор

Сарженор ефервесцентни таблетки не съдържа захар. Таблетките са подсладени със захарин натрий.

Сарженор ефервесцентни таблетки съдържа оцветител Е 110 и поради това е възможно да причини алергични реакции.

Сарженор ефервесцентни таблетки съдържа също и сорбитол (в състава на аромата на портокал). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този лекарствен продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ САРЖЕНОР

Дозировка и начин на приложение

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Възрастни: до 2-3 ефервесцентни таблетки дневно, в продължение на 8–15 дни.

Употреба при деца и юноши

Деца от 3 до 12 години: ½-2 ефервесцентни таблетки дневно, в зависимост от възрастта, в продължение на 8–15 дни.

Това лекарство не трябва да се прилага без лекарски съвет при деца под 12 години.

Да не се превишава максималната доза от 3 ефервесцентни таблетки дневно!



Сарженор ефервесцентни таблетки се приемат през устата, предварително разтворени в чаша вода. Таблетките могат да се приемат на равномерно разпределени през целия ден дози или като единичен прием. Този лекарствен продукт може да се приема и вечер преди лягане.

Ако сте приели повече от необходимата доза Сарженор

Ако по невнимание приемете по-висока доза, прекратете лечението и потърсете съвет от лекар.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Сарженор ефервесцентни таблетки може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В редки случаи са наблюдавани следните нежелани реакции:

Нарушения на кожата и подкожната тъкан: мехуро-подобни обриви по кожата (макулопапулозни обриви);

Промени в лабораторните показатели (изследвания): повишаване нивото на глюкоза в кръвта

Нежелани реакции с неизвестна честота: стомашно-чревни нарушения при високи дози: диария, повръщане, гадене

Ако някоя от нежелани лекарствени леакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля да уведомите Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8,

1303 София,

тел.: +35 928903417,

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Сарженор

Да се пази от влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Не използвайте Сарженор след срока на годност, ясно обозначен върху картонената опаковката и тубата! Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Отпуска се без лекарско предписание.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Сарженор ефервесцентни таблетки

Всяка ефервесцентна таблетка (с маса 1,966 g) съдържа:

Активно вещество: 1 g аргинин аспартат;

Помощни вещества: лимонена киселина, натриев хидрогенкарбонат, натриев карбонат, безводен, натриев цитрат, захарин натрий, оцветител Е 110, силициев диоксид, колоиден, безводен, аромат на портокал.

Ароматът на портокал съдържа в състава си сорбитол.

Как изглежда Сарженор и какво съдържа опаковката



Сарженор ефервесцентни таблетки е наличен в картонена кутия от 20 или 40 ефервесцентни таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Майлан ЕООД

Офис сграда „Сердика офиси“

бул. Ситняково № 48, ет. 7

1505 София

България

Производител

HERMES PHARMA Ges.m.b.H.

Schwimmschulweg 1a, 9400 Wolfsberg,

Австрия

Дата на последно одобрение на листовката

Май 2022 г.

