

Листовка: информация за потребителя	Листовка - Приложение 2
Листовка №	9600125
Листовка №	36593 17-02-2017

Листовка: информация за потребителя

Селегос 5 mg таблетки

Selegos 5 mg tablets

селегилинов хидрохлорид / selegiline hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаките на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Селегос и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Селегос
3. Как да приемате Селегос
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Селегос
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Селегос и за какво се използва

Селегос съдържа активното вещество селегилинов хидрохлорид. Селегос се използва за лечение на болестта на Паркинсон.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Селегос

Не приемайте Селегос

- ако сте алергични към селегилин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Признаките на алергична реакция включват: обрив, проблеми с прегъдането или дишането, оток на устните, гърлото или езика.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Селегос.

- Съвместно приложение на други лекарствени продукти (вижте раздели „Обърнете специално внимание при употребата на Селегос“ и „Други лекарства и Селегос“)
- Страдате от психични заболявания.
- По време на бременност и кърмене.
- Селегилин не трябва да се предписва при пациенти с активна язва на stomахa и дванадесетопръстника.
- Да се прилага с повишено внимание при пациенти с тежки нарушения на чернодробната и бъбреchnата функция.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Селегос.

Обърнете специално внимание при употребата на Селегос

Трябва да се посъветвате с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате Селегос при:

Комбинираното приложение на селегилин и леводопа е противопоказано при пациенти с:

- хипертония (високо кръвно налягане);
- тиреотоксикоза (заболяване на щитовидната жлеза);

