

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява СИМИЛАСАН Ичи Ай и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате СИМИЛАСАН Ичи Ай
3. Как да използвате СИМИЛАСАН Ичи Ай
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате СИМИЛАСАН Ичи Ай
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### 1. Какво представлява СИМИЛАСАН Ичи Ай и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт

В съответствие с хомеопатичните принципи Симиласан Ичи Ай, капки за очи може да се използва локално за облекчаване на очните симптоми на сенна хрема или реакции на свръхчувствителност на лигавиците на очите и клепачите, като например:

- Сърбеж и парене на очите;
- Зачервяване;
- Подуване;
- Засилено сълзене.

Използването на този хомеопатичен лекарствен продукт се основава само на хомеопатичен опит.

Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате СИМИЛАСАН Ичи Ай

Не използвайте СИМИЛАСАН Ичи Ай:

- Ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- При малки деца под 2-годишна възраст.

Предупреждения и предпазни мерки



Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате **СИМИЛАСАН Ичи Ай**, ако:

- Имате катаракта или глаукома;
- Страдате от други заболявания;
- Имате алергии;
- Приемате други лекарства (дори такива, които сте закупили без рецепт) за вътрешно или външно приложение.

При употреба на хомеопатично лекарство, първоначално симптомите могат да станат поизразени за кратък период от време (първоначално обостряне).

**Мерки, които трябва да се вземат в случай на първоначално влошаване (първоначално обостряне) на симптомите:**

- Спрете употребата на лекарството, докато влошаването не премине.
- Отново започнете лечението до пълно възстановяване.
- Ако влошаването на симптомите продължава, прекратете използването на **СИМИЛАСАН Ичи Ай** и информирайте Вашия лекар или фармацевт.

При възпаление на окото, не се препоръчва носене на контактни лещи. Все пак, ако това се налага, отстранете контактните лещи, преди да използвате капките за очи и поставете лещите най-рано 15 минути след прилагане на лечението.

При използване на **СИМИЛАСАН Ичи Ай** капки за очи преди лягане и сутрин след събуждане, е препоръчително да сте свалили контактните си лещи или да изчакате 15 минути, преди да поставите лещите в очите.

Моля да имате предвид, че сухите очи са по-чувствителни към използването на контактни лещи.

Ако състоянието Ви се влоши или се появяват нови симптоми като замъглено виждане или болка, незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

Използването на този хомеопатичен лекарствен продукт не може да замени лекарската диагноза или други предписани от лекаря лекарствени продукти.

#### **Деца**

Поради недостатъчно данни, използването на **СИМИЛАСАН Ичи Ай** при деца под 2-годишна възраст не се препоръчва.

#### **Други лекарства и *СИМИЛАСАН Ичи Ай***

Въпреки че до този момент не са съобщени взаимодействия със **СИМИЛАСАН Ичи Ай**, ако приемате други лекарства, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате тези капки за очи.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

#### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Досегашният опит показва, че няма известен рисък при бременност или кърмене, когато продуктът се използва в съответствие с препоръките.

Въпреки това, с този продукт никога не са провеждани систематични клинични изпитвания.

Като предпазна мярка, ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

#### **Шофиране и работа с машини**



**СИМИЛАСАН Ичи Ай** капки за очи няма или има незначително влияние върху способността за шофиране или работа с машини.

### 3. Как да използвате **СИМИЛАСАН Ичи Ай**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### *Препоръчителната доза*

Деца над 2-годишна възраст и възрастни: 1-2 капки във всяко око веднъж или няколко пъти на ден, освен ако Вашият лекар не е предписал друго.

#### *Инструкции за употреба:*

- Притиснете гумената част на апликатора-капкомер с два пръста и капнете капките в окото.
- Избягвайте да докосвате върха на капкомера с пръсти и директен контакт с окото.
- След употреба веднага поставете капачката и затворете опаковката.

Спазвайте дозировката, указана в листовката или предписана от Вашия лекар. Ако не се наблюдава подобрене, особено при дете, потърсете съвет от лекар. Ако смятате, че лекарството Ви действа твърде слабо или прекалено силно, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

**Ако сте използвали повече от необходимата доза **СИМИЛАСАН Ичи Ай****  
Досега не са съобщавани случаи на предозиране.

#### **Ако сте пропуснали да използвате **СИМИЛАСАН Ичи Ай****

Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При употреба на **СИМИЛАСАН Ичи Ай** в съответствие с предписанията, са наблюдавани изолирани случаи на реакции на свръхчувствителност, като парене, дразнене, зачевяване, сърбеж и болка в очите.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някакви нежелани реакции.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ №8,  
1303 София,  
тел: +35928903417,  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg).



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## 5. Как да съхранявате СИМИЛАСАН Ичи Ай

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след първо отваряне: 3 месеца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлят лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа СИМИЛАСАН Ичи Ай

Активните вещества са: Apis mellifica D 6, Euphrasia 3c D 6, Schoenocaulon officinale D6.

Другите съставки са: натриев нитрат, натриев тетраборат, борна киселина, сребърен сулфат, пречистена вода.

### Как изглежда СИМИЛАСАН Ичи Ай и какво съдържа опаковката

СИМИЛАСАН Ичи Ай капки за очи е стерилен, прозрачен, безцветен разтвор, в кафява стъклена бутилка от 10 ml.

### Притежател на разрешението за употреба

ММ Фарма Сървис ЕООД

ул. Родопи № 65, ет. 4, ап.6

гр. Пловдив 4000

България

### Производител

Медитрайл Интернейшънълс ЕООД

ул. Цанко Церковски №80

София 1421

България

### Дата на последно преразглеждане на листовката

