

Б. ЛИСТОВКА



ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Към Рег. № 2005.0036

86/М/17/71-57028

Синупрет форте обвити таблетки

Sinupret forte coated tablets

Разрешение №

17. 12. 2021

Удобрение №

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 - 14 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Синупрет форте обвити таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Синупрет форте обвити таблетки
3. Как да приемате Синупрет форте обвити таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Синупрет форте обвити таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИНУПРЕТ ФОРТЕ обвити таблетки И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Синупрет форте обвити таблетки се използва за лечение на остри и хронични възпаления на параназалните синуси и дихателните пътища, както и като допълнително средство при антибиотично лечение на тези заболявания.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ СИНУПРЕТ ФОРТЕ обвити таблетки**Не приемайте Синупрет форте обвити таблетки:**

Ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т.б.).

Предупреждения и предпазни мерки

Ако симтомите продължат повече от 7-14 дни, влошават се или се повтарят периодично, или ако се появи задух, повишена температура или гнойни храчки, консултирайте се с Вашия лекар.

Деца

Употребата при деца по-малки от 12 години не се препоръчва поради недостатъчно данни.

Други лекарства и Синупрет форте обвити таблетки
Взаимодействия с други лекарства засега не са известни.



Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Синупрет форте обвити таблетки с храна, напитки и алкохол
Няма констатирано взаимодействие с храна, напитки и алкохол.

Бременност, кърмене и фертилитет

Както всички лекарства Синупрет форте може да се прилага по време на бременност и кърмене само след консултация с лекар.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини:

Синупрет форте обвити таблетки няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Специални предупреждения

Синупрет форте обвити таблетки съдържа глюкоза, лактоза, захароза и сорбитол.

Ако Вашият лекар Ви е уведомил, че имате непоносимост към някои захари, преди да приемете този лекарствен продукт, свържете се с Вашия лекар.

1 обвита таблетка Синупрет форте съдържа средно 0,03 хлебни единици (CEU).

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СИНУПРЕТ ФОРТЕ обвити таблетки

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Моля, следвайте посочената дозировка, тъй като в противен случай Синупрет *форте* обвити таблетки може да не бъдат напълно ефективни.

Препоръчителната доза е за възрастни и юноши над 12 години: 1 обвита таблетка 3 пъти дневно.

Обвитата таблетка трябва да се прегълтне без да се дъвче, ако желаете с малко течност (напр. чаша вода). Пациенти с чувствителен stomах трябва да бъдат посъветвани да приемат Синупрет форте обвити таблетки след хранене.

Синупрет форте обвити таблетки не трябва да се приемат повече от 7 - 14 дни. Моля вижте информацията в Предупреждения и предпазни мерки.

Ако сте приели повече от необходимата доза Синупрет форте обвити таблетки

Ако сте приели по-голямо количество Синупрет форте обвити таблетки, повече от колкото е допустимо да се приеме, моля уведомете Вашия лекар. Вашият лекар ще реши дали е необходимо да предприемете никакви действия. Възможно е нежеланите реакции, изброени по-долу да се усилят.

Ако сте пропуснали да приемете Синупрет форте обвити таблетки

Ако сте приели твърде малко Синупрет форте обвити таблетки или сте забравили да приемете Синупрет форте обвити таблетки, не вземайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата, а изчакайте да дойде време за следващата доза и продължете приема както ги има предписан от Вашият лекар или както е описано в тази листовка: информация за потребителя.

Ако сте спрели употребата на Синупрет форте обвити таблетки

Спирането на приема на Синупрет форте обвити таблетки обикновено не предизвиква никакви проблеми.



Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4 ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Стомашни оплаквания (като стомашна болка, повъръщане) са нечести.

Кожни реакции на свръхчувствителност като обрив, зачеряване на кожата, сърбеж са редки.

Освен това може да се наблюдават, алергични реакции като подуване на устните, езика и гърлото и/или ларингса със стесняване на дихателните пътища (ангиоедем), недостиг на въздух и оток на лицето.

При първи прояви на реакция на свръхчувствителност Синупрет форте обвити таблетки не трябва отново да се приемат.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СИНУПРЕТ ФОРТЕ обвити таблетки

Да се съхранява под 30°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност:

Срокът на годност е 4 (четири) години.

Да не се използва след изтичане на срока на годност, отбелаян на опаковката!

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Синупрет форте обвити таблетки

- Активните вещества за 1 обвита таблетка са:

Gentianae radix pulv. (Тинтява, корен)	12 mg
Primulae flos cum calycibus pulv. (Иглица, цвят с чашка).	36 mg
Rumicis herba pulv. (Киселец, стрък).	36 mg
Sambuci flos pulv. (Черен бъз, цвят).	36 mg
Verbenae herba pulv. (Върбинка, стрък).	36 mg

- Помощните вещества са: Еудражит Е 12.5; желатина; течна глукоза; индигокармин (Е 132); хлорофил прах 25% (Е 141); рибофлавин (Е101); картофено нишесте; лактоза; монохидрат; царевично нишесте; декстрин; магнезиев оксид, лек; монтан гликолов въськ; калциев карбонат; рициново масло, рафинирано; захароза; шеллак; силициев диоксид, колоиден, безводен; сорбитол; стеаринова киселина; талк; титанов диоксид; пречистена вода.

Как изглежда Синупрет форте обвити таблетки и какво съдържа опаковката
Кръгли, двойно изпъкнали, зелени обвити таблетки с гладка подвърхност. Блистери от PVC/PVDC/Al-фолия, поставени в картонени кутии, съдържащи 20 ≤ 25 ≤ 50 или 100 обвити таблетки и болнична опаковка, съдържаща 500 (10 блистера x 50) обвити таблетки.



Синупрет форте е растителен лекарствен продукт, който много добре се понася и има муколитично и противовъзпалително действие. Растителните активни вещества, съдържащи се в Синупрет форте обвити таблетки и противовъзпалителните вещества, съдържащи се в цвета с чашка от иглица, стръка от киселец и цвета от черен бъз намаляват подуването на мукозните мембрани и изсушават носа, успокояват кашлицата и улесняват отделянето на секрети от горните дихателни пътища. Така те допринасят за възстановяването на мукозните тъкани. Главоболието, в резултат на остро и хронично възпаление на параназалните синуси (синузит) и често придружено с възпаление на носната лигавица получават бързо облекчение.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
92318 Neumarkt/ Германия

За допълнителна информация за този продукт, моля обадете се на местния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Айкор България ЕООД
Бул. „Илиянци“ № 42, гр. София 1220, България
Тел.: +359885189691

Дата на последно преразглеждане на листовката
октомври 2021 г.

