

Листовка: информация за потребителя

9500008

Към Рег. №

B6777741-5-7733

Стрепсилс Портокал с Витамин С 1,2 mg/0,6 mg/100 mg таблетки за смучане

2,4-Дихлорбензилов алкохол/Амилметакрезол/Аскорбинова киселина

08-02-2022

Strepsils® Orange with Vitamin C 1,2 mg/0,6 mg/100 mg lozenges

2,4-Dichlorobenzyl alcohol/Amylmetacresol/Ascorbic Acid

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Стрепсилс Портокал с Витамин С и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Стрепсилс Портокал с Витамин С
3. Как да приемете Стрепсилс Портокал с Витамин С
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Стрепсилс Портокал с Витамин С
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Стрепсилс Портокал с Витамин С и за какво се използва
Стрепсилс Портокал с Витамин С принадлежи към група лекарствени продукти наречани антисептици.

Стрепсилс Портокал с Витамин С се препоръчва за лечение и облекчаване на симптомите при инфекциозно-възпалителни заболявания на устната кухина (стоматити, фарингити, ларингити). Всяка таблетка Стрепсилс Портокал с Витамин С съдържа Витамин С, който е особено необходим за организма по време на инфекции на устната кухина и гърлото.

Притежава антибактериални, противогъбични и антивирусни свойства.

Ефектът се проявява в първите 5 минути и продължава до 2 часа след приложението на лекарствения продукт.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Стрепсилс Портокал с Витамин С

Не приемайте Стрепсилс Портокал с Витамин С

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към 2,4-Дихлорбензилов алкохол, Амилметакрезол и Аскорбинова киселина или към някоя от останалите съставки на Стрепсилс Портокал с Витамин С;
- от деца под 6 годишна възраст.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Стрепсилс Портокал с Витамин С



Обърнете специално внимание при употреба на Стрепсилс Портокал с Витамин С

- ако имате захарен диабет – виж раздел **Важна информация за някои от съставките на Стрепсилс Портокал с Витамин С.**

Деца

Този лекарствен продукт е противопоказан при деца под 6 годишна възраст

Други лекарства и Стрепсилс Портокал с Витамин С

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти.

Приложение на Стрепсилс Портокал с Витамин С с храни и напитки

Стрепсилс Портокал с Витамин С не трябва да се прилага с храни и напитки. Да се прилага между храненията.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Не са налични или има ограничено количество от данни за използването на Амилметакрезол, 2,4-Дихлорбензилов алкохол и Аскорбинова киселина. Както при всички лекарствени продукти, трябва да се внимава при използването на този продукт по време на бременност и при необходимост да се потърси лекарски съвет.

Кърмене

Аскорбиновата киселина или нейните метаболити се екскретират в майчиното мляко, но при терапевтични дози от продукта не може да се очаква ефект върху кърмени новородени/бебета. Не е известно дали 2,4-Дихлорбензилов алкохол, Амилметакрезол или техните метаболити се екскретират в майчиното мляко. Не може да се изключи риска за новородените/бебетата.

Фертилитет

Няма налични данни за ефект върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини

Стрепсилс Портокал с Витамин С не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от съставките на Стрепсилс Портокал с Витамин С

Това лекарство съдържа съвсем малки количества глютен (от пшенично нишесте). Счита се, че е „без глютен“ и е малко вероятно да предизвиква проблеми ако имате цьолиакия.

Една таблетка за смучене съдържа не повече от 19,36 микрограма глютен.

Ако имате алергия към пшеница (което е различно от цьолиакия), Вие не трябва да приемате това лекарство.

Това лекарство съдържа 3 mg пропиленгликол във всяка таблетка за смучене.



Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на една таблетка за смучене, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

Това лекарство съдържа аромат с Цитрал, Цитронелол, d-Лимонен, Гераниол и Линалоол. Цитрал, Цитронелол, d-Лимонен, Гераниол и Линалоол, които могат да причинят алергични реакции.

Стрепсилс Портокал с Витамин С съдържа 0,97 g глюкоза и 1,44 g захароза на една таблетка за смучене. Трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

Съдържа сулфити (серен диоксид (E 220)): В редки случаи може да причини тежки реакции на свръхчувствителност и бронхоспазм.

Таблетките за смучене съдържат сънсет жълто FCF (E 110) и понсо 4R (E 124) като оцветители, които могат да причинят алергични реакции.

3. Как да приемете Стрепсилс Портокал с Витамин С

Винаги приемайте Стрепсилс Портокал с Витамин С точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Да се използва най-ниската ефективна доза за най-кратък период от време необходим за облекчаване на симптомите.

Възрастни и деца над 6 години:

Една таблетка се смуче бавно през 2 – 3 часа; таблетките за смучене се оставят в устата до пълното им разтваряне; да не се дъвчат или поглъщат цели; приемат се между храненията. Както при други подобни лекарствени продукти, Ви трябва да сменят позицията на таблетките за смучене във вътрешността на устата до тяхното разтваряне, за да се избегне риска от локално дразнене. Да не се превишава препоръчаната доза (максимум 8 таблетки за смучене за 24 часа).

Употреба при деца

Деца под 6 годишна възраст не трябва да използват този продукт.

За да се избегне риска от задавяне, Стрепсилс Портокал с Витамин С се прилага само при деца, които могат без надзор да задържат таблетката за смучене в устата докато тя се разтвара бавно.

Пациенти в старческа възраст

При пациенти в старческа възраст не е необходимо да се намалява дозата.

Лечението не трябва да продължава повече от 5 дни тъй като може да доведе до дисбаланс на устната микробна флора и риск от бактериална или гъбична инфекция.

Ако сте приели повече от необходимата доза Стрепсилс Портокал с Витамин С

Може да се появи стомашно-чревен дискомфорт. Употребата трябва да се прекрати и да се започне симптоматично лечение – за тази цел трябва да се консултирате с Вашия лекар или център за спешна помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Стрепсилс Портокал с Витамин С

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка за смучене.



Ако спрете да приемете Стрепсилс Портокал с Витамин С
Ако спрете приема твърде скоро, това няма да се отрази на Вашето състояние.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Стрепсилс Портокал с Витамин С може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възможните нежелани лекарствени реакции, които могат да бъдат свързани с Амилметакрезол, 2,4-Дихлорбензилов алкохол и Аскорбинова киселина са представени по-долу, групирани по система-орган клас класификацията и честота.

Честотата се определя както следва:

Много чести ($\geq 1/10$);

Чести ($\geq 1/100$ до $< 1/10$);

Нечести ($\geq 1/1,000$ до $< 1/100$);

Редки ($\geq 1/10,000$ до $< 1/1,000$);

Много редки ($< 1/10,000$);

С неизвестна честота (не може да бъде определена от наличните данни).

В отделните групи по честота нежеланите реакции са представени в низходящ ред според степента на сериозност:

С неизвестна честота

Реакциите на свръхчувствителност могат да се проявят под формата на:

Обрив, ангиоедем, уртикария, бронхоспазм и хипотония със синкоп;

Болки в корема, гадене, дискомфорт в устната кухина.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Стрепсилс Портокал с Витамин С

Да се съхраняват под 25°C.

Не използвайте Стрепсилс Портокал с Витамин С след срока на годност отбелязан на картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.



Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще помагат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Стрепсилс Портокал с Витамин С

Активните вещества са: 2,4-Дихлорбензилов алкохол 1,2 mg, Амилметакрезол 0,6 mg, Витамин С 100 mg.

Другите съставки са: левоментол, винена киселина, портокалова есенция PHL 105288, течна глюкоза, течна захароза, оцветители сънсет жълто FCF (E 110) и понсо 4R (E 124), пропиленгликол.

Как изглежда Стрепсилс Портокал с Витамин С и какво съдържа опаковката

Оранжево оцветена овална таблетка за смучене, с характерен аромат и портокалов вкус, и отпечатано лого S от двете страни.

Опаковките Стрепсилс Портокал с Витамин С съдържат 24 таблетки за смучене в блистери от твърдо алуминево фолио PVC/PVDC и картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:

Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L.

48 Iancu de Hunedoara Boulevard, Building Crystal Tower
11th Floor, District 1, Bucharest, Румъния

Производител:

RB NL Brands B.V.
Schiphol Boulevard 207
1118 BH Schiphol,
Нидерландия

Моля свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за употреба за да получите допълнителна информация за лекарствения продукт.

Дата на последно преразглеждане на листовката: ноември, 2021

