

Листовка: информация за пациентта**ТадиЛЕКС 20 mg филмирани таблетки****TadiLEX 20 mg film-coated tablets****Тадалафил (Tadalafil)**

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате никакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаките на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява ТадиЛЕКС и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ТадиЛЕКС
3. Как да приемате ТадиЛЕКС
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ТадиЛЕКС
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ТадиЛЕКС и за какво се използва

ТадиЛЕКС е за лечение на възрастни мъже с еректилна дисфункция. Това е състояние, при което мъжът не може да достигне, или да задържи твърд, еректиран пенис, подходящ за сексуална активност. ТадиЛЕКС показва значително подобреие на способността да се получи твърд, еректиран пенис, подходящ за сексуална активност.

ТадиЛЕКС съдържа активното вещество тадалафил, което принадлежи към групата лекарствени продукти, наречени инхибитори на фосфодиестеразата тип 5. След сексуална стимулация ТадиЛЕКС действа като помага на кръвоносните съдове във Вашия пенис да се отпуснат и да позволят притока на кръв в пениса Ви. Резултатът от това е подобрена еректилна функция. ТадиЛЕКС няма да Ви помогне, ако нямаете еректилна дисфункция.

Важно е да се отбележи, че ТадиЛЕКС не действа, ако няма сексуална стимулация. Вие и Вашият партньор ще трябва да се включите в любовната игра, също както бихте направили, ако не вземате лекарство за еректилна дисфункция.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ТадиЛЕКС

Не приемайте ТадиЛЕКС, ако:

- сте алергични към тадалафил или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);



- вземате някакъв вид органичен нитрат или донори на азотен оксид като амил нитрит. Това са група лекарства („нитрати”), използвани при лечението на ангина пекторис („гръден болка”). ТадиЛЕКС е показал, че увеличава ефектите на тези лекарства. Ако вземате някаква форма на нитрати или не сте сигурни, кажете на лекаря си;
- имате сериозно сърдечно заболяване или имате скорошен сърдечен пристъп през последните 90 дни;
- имате скорошен мозъчен инсулт (удар) през последните 6 месеца;
- имате ниско кръвно налягане или неконтролирано високо кръвно налягане;
- някога сте имали загуба на зрение в резултат на неартериална антериорна исхемична очна невропатия (NAION) – състояние, описано като „инсулт на окото”;
- приемате риоцигуат. Това лекарство се използва за лечение на белодробна артериална хипертония (т.е. високо кръвно налягане в белите дробове) и хронична тромбоемболична белодробна хипертония (т.е. високо кръвно налягане в белите дробове в резултат на кръвни съсиреци). Доказано е, че ФДЕ5 инхибиторите, като ТадиЛЕКС, засилват ефекта на понижаване на кръвното налягане на това лекарство. Ако вземате риоцигуат или не сте сигурни, информирайте Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете ТадиЛЕКС.

Обърнете внимание, че сексуалната активност носи възможни рискове за пациенти със сърдечно заболяване, поради това, че допълнително натоварва сърцето Ви. Ако имате сърдечни проблеми, трябва да кажете на лекаря си.

Преди да приемете таблетките, уведомете Вашия лекар, ако имате:

- сърповидно-клетъчна анемия (аномалия на червените кръвни клетки);
- мултиплън миелом (тумор на костния мозък);
- левкемия (тумор на кръвните клетки);
- някаква деформация на пениса;
- сериозен проблем с черния дроб;
- сериозен проблем с бъбреците.

Не е известно дали ТадиЛЕКС е ефективен при пациенти, които имат:

- тазова операция;
- отстраняване на цялата или на част от простатната жлеза, при което са прекъснати нервите на простатата (радикална, несъхраняваща нерва простатектомия).

Ако получите внезапно намаление или загуба на зрението, спрете приема на ТадиЛЕКС и незабавно се свържете с Вашия лекар.

При някои пациенти, приемащи тадалафил, е отбелаязан намален слух или внезапна загуба на слуха. Въпреки че не е известно дали събитието е пряко свързано с тадалафил, ако получите намален слух или внезапна загуба на слуха, спрете приема на ТадиЛЕКС и незабавно се свържете с Вашия лекар.

ТадиЛЕКС не е предназначен за употреба от жени.



Деца и юноши

ТадиЛЕКС не е предписан за употреба от деца и юноши под 18 години.

Други лекарства и ТадиЛЕКС

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, насъкоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не приемайте ТадиЛЕКС, ако вече приемате нитрати.

Някои лекарства може да бъдат повлияни от ТадиЛЕКС или те може да окажат влияние върху това колко добре ще действа ТадиЛЕКС. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако вече приемате:

- алфа блокер (употребява се за лечение на високо кръвно налягане или на уринарни симптоми, свързани с доброкачествена хиперплазия (увеличение) на простата);
- други лекарства за лечение на високо кръвно налягане;
- риоцигут;
- инхибитор на 5-алфа редуктазата (употребява се за лечение доброкачествена хиперплазия (увеличение) на простата);
- лекарства като кетоконазол таблетки (за лечение на гъбични инфекции) и протеазни инхибитори за лечение на СПИН или HIV-инфекция;
- фенобарбитал, фенитоин и карбамазепин (противогърчови лекарства);
- рифампицин, еритромицин, кларитромицин или итраконазол;
- други видове лечения на еректилна дисфункция.

ТадиЛЕКС с храни, напитки и алкохол

Информацията за ефекта на алкохола е в раздел 3. Сокът от грейпфрут може да окаже влияние върху това колко добре ще действа ТадиЛЕКС и трябва да се приема с повишено внимание.
Говорете с Вашия лекар за повече информация.

Бременност, кърмене и фертилитет

ТадиЛЕКС не е предписан за употреба от жени.

Бременност

Има ограничени данни за употребата на ТадиЛЕКС при бременни жени. Като предпазна мярка, за предпочтение е употребата на ТадиЛЕКС по време на бременност да се избягва.

Кърмене

Наличните данни при животни показват преминаване на ТадиЛЕКС в млякото. Не може да се изключи риск за кърмачето. ТадиЛЕКС не трябва да се използва по време на кърмене.

Фертилитет

При лечение на кучета е наблюдавано намалено образуване на сперма в тестисите. Намаляване на спермата се наблюдава при някои мъже. Тези ефекти е малко вероятно да доведат до липса на фертилитет.

Шофиране и работа с машини

В клинични проучвания някои мъже, вземащи ТадиЛЕКС, са съобщили, че получават замаяност. Проверете внимателно как понасят таблетките преди да шофирате или използвате машини.

ТадиЛЕКС съдържа лактоза:



Ако имате непоносимост към някои захари, то се свържете с Вашия лекар преди приема на това лекарство.

3. Как да приемате ТадиЛЕКС

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Таблетките ТадиЛЕКС са за употреба през устата само при мъже. Погълщайте таблетката цяла с малко вода. Можете да вземате таблетките със или без храна.

Препоръчителната начална доза е 10 mg преди сексуална активност. Въпреки това, може да Ви бъде дадена доза от една таблетка от 20 mg, тъй като Вашият лекар е решил, че препоръчителната доза от 10 mg е твърде слаба.

Вие можете да вземете таблетка ТадиЛЕКС поне 30 минути преди сексуална активност. ТадиЛЕКС може да е още ефективен до 36 часа след прием на таблетката.

Не вземайте ТадиЛЕКС повече от веднъж дневно. ТадиЛЕКС 20 mg е предназначен за употреба преди очаквана сексуална активност и не се препоръчва за продължителна ежедневна употреба.

Важно е да се отбележи, че ТадиЛЕКС не действа без сексуална стимулация. Вие и Вашият партньор ще трябва да се включите в предварителна игра, също както бихте, ако не вземате лекарство за еректилна дисфункция.

Употребата на алкохол може да повлияе Вашата способност за ерекция и може временно да намали Вашето кръвно налягане. Ако Вие сте приели или планирате да приемете ТадиЛЕКС, избягвайте прекомерната употреба на алкохол (ниво на алкохол в кръвта от и над 0,08%), тъй като това може да увеличи риска от световъртеж, когато ставате.

Ако сте приели повече от необходимата доза ТадиЛЕКС

Свържете се с Вашия лекар. Може да получите нежелани ефекти, описани в точка 4.

Ако сте пропуснали да приемете ТадиЛЕКС

Вземете Вашата доза веднага щом като се сетите, но не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка. Вие не трябва да вземате ТадиЛЕКС повече от веднъж дневно.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Тези ефекти обикновено са леки до умерени.

Ако получите някои от следните нежелани лекарствени реакции, спрете употребата на лекарството и незабавно потърсете медицинска помощ:

- алергични реакции, включително обриви (честота - нечести);
- болка в областта на гърдния кош – не използвайте нитрати, а ~~резервали~~ потърсете медицинска помощ (честота - нечести);



- приапизъм, продължителна и възможно болезнена ерекция след прием на ТадиЛЕКС (честота редки). Ако имате подобна ерекция, която трае в продължение на повече от 4 часа, трябва незабавно да се свържете с лекаря си;
- внезапна загуба на зрение (честота - редки).

Други съобщавани нежелани реакции:

Чести: (наблюдавани при 1 до 10 на всеки 100 пациенти)

- главоболие, болка в гърба, мускулни болки, болка в ръцете и краката, зачервяване на лицето, запушване на носа и лошо храносмилане.

Нечести: (наблюдавани при 1 до 10 на всеки 1 000 пациенти)

- замаяност, коремна болка, гадене, повръщане, киселини, замъглено виждане, болка в очите, затруднено дишане, наличие на кръв в урината, продължителна ерекция, усещане за силно сърдебиене, учестен пулс, повишено кръвно налягане, понижено кръвно налягане, кървене от носа, шум в ушите, подуване на ръцете, краката или глезните и умора.

Редки: (наблюдавани при 1 до 10 на всеки 10 000 пациенти)

- слабост, припадъци и преходна загуба на памет, подуване на клепачите, зачервяване на очите, внезапно намаляване или загуба на слуха, уртикария (сърбящи червени петна на повърхността на кожата), кървене от пениса, наличие на кръв в семенната течност и повишено потене.

При мъже, приемащи ТадиЛЕКС, рядко са съобщавани също инфаркт и инсулт. Повечето от тези мъже са имали известни сърдечни проблеми преди да вземат това лекарство.

Рядко е съобщавано за частично, временно или постоянно намаление или загуба на зрение на едното или двете очи.

Някои допълнителни редки нежелани реакции са съобщени при мъже, приемащи ТадиЛЕКС, които не са наблюдавани в клинични проучвания. Те включват:

- мигрена, оток на лицето, сериозна алергична реакция, причиняваща оток на лицето или гърлото, сериозни кожни обриви, някои нарушения, повлияващи кръвотока към очите, неравномерен пулс, стенокардия, и внезапна сърдечна смърт.

Нежеланата реакция замаяност е съобщена по-често при мъже на възраст над 75 години, които приемат ТадиЛЕКС. Диария се съобщава по-често при мъже на възраст над 65 години, които приемат ТадиЛЕКС.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ):

ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София,
тел.: +359 2 8903 417
ел. поща: bda@bda.bg
уебсайт: www.bda.bg



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ТадиЛЕКС

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°C в оригиналната опаковка.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелзан върху картонената опаковка.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или контейнера за домашни отпадъци. Попитайте
Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще
спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ТадиЛЕКС

- Активното вещество е: тадалафил (*tadalafil*).

Една филмирана таблетка съдържа 20 mg тадалафил.

-Другите съставки са:

Таблетно ядро: лактозаmonoхидрат, L-хидроксипропилцелулоза - LH 11,
L-хидроксипропилцелулоза – EF, кроскармелоза натрий, натриев лаурисулфат,
микрокристалинна целулоза РН 102, магнезиев стеарат.

Филмово покритие Опадрай II TAN 85G27001 съдържа: лецитин, жълт железен оксид, титанов
диоксид, червен железен оксид, поливинилов алкохол, частично хидролизиран, талк, черен
железен оксид, полиетилен гликол.

Как изглежда ТадиЛЕКС 20 mg и какво съдържа опаковката

ТадиЛЕКС 20 mg филмирани таблетки са бледо оранжеви, двойноизпъкнали филмирани таблетки
с форма на капка, с релефно изображение "20" от едната страна.

Един блистер съдържа 2 броя филмирани таблетки.

Размери на опаковката: 2 броя филмирани таблетки (1 опаковка/ 1 блистера);

4 броя филмирани таблетки (1 опаковка/ 2 блистера);

8 броя филмирани таблетки (1 опаковка/ 4 блистера);

Притежател на разрешението за употреба и производител

НОБЕЛ ФАРМА ЕООД

Ул. „Околовръстен път“ № 36
1415 София, България

Дата на последно преразглеждане на листовката:

02/2021

