

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	20160127
Разрешение №	03-05-2023
Оборудване №	

Листовка: информация за пациента

Траумил S инжекционен разтвор
Traumeel S solution for injection

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Траумил S и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Траумил S
3. Как да приемете Траумил S
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Траумил S
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Траумил S и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт, използван за облекчаване на болка и възпаление при остри и хронични травми и дегенеративни заболявания на меките тъкани на опорно-двигателния апарат.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Траумил S

Не приемайте Траумил S

- ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта, както и свръхчувствителност към *Achillea millefolium*, *Arnica Montana*, *Matricaria recutita* или други растения от семейство сложноцветни

Този лекарствен продукт съдържа ехинацея и не трябва да се използва при прогресивни автоимунни заболявания, придобита имунна недостатъчност, имunosупресивно лечение, левкемия и други заболявания с нарушения в имунитета.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Траумил S.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши се консултирайте с лекар или фармацевт.



Други лекарства и Траумил S

Не са известни лекарствени взаимодействия.

Траумил S с храна, напитки и алкохол

Няма несъвместимости.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Траумил S не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

Траумил S съдържа натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) за доза, т.е. може да се счита, че е без съдържание на натрий.

Траумил S съдържа етанол

Този лекарствен продукт съдържа 2.4 mg алкохол (етанол) във всяка ампула (0.1%w/w). Количеството в една ампула съответства на по-малко от 1 ml бира или 1 ml вино. Ниското съдържание на алкохол няма да предизвика забележими реакции.

3. Как да се прилага Траумил S

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Препоръчителната доза е:

При възрастни и деца над 12 г. обикновено 1 ампула 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 1 ампула дневно, след което се преминава към станартната дозировка.

Начин на приложение:

Траумил S може да се прилага от медицинско лице подкожно, мускулно, околиставно.

Инструкции за отваряне на ампулата:



Дръжте ампулата внимателно. Следвайте точно инструкциите за отваряне. Не е нужно да режете ампулата, за да я отворите. Хванете ампулата под ъгъл и разклатете, за да няма разтвор в главата на ампулата. След това счупете ампулата като натиснете над цветната точка. Изхвърлете отпадъците след употреба.



Ако сте приели повече от необходимата доза Траумил S
Траумил S няма доза на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Траумил S
Не трябва да се прилага двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а се продължава по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Траумил S
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Траумил S може да причини нежелани реакции, въпреки че не всички ги получават.

В много редки случаи могат да се получат алергични реакции (реакции на свръхчувствителност), като леки кожни реакции, зачервяване/подуване на мястото на инжектиране, до тежки алергични реакции. Честотата на тези реакции не е известна.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Траумил S

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност – 5 години.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Траумил S

1 ампула от 2,2 ml (=2,2 g) съдържа:

- Активни съставки:

Achillea millefolium	D3	2,2 mg
Aconitum napellus	D2	1,32 mg



Arnica montana	D2	2,2 mg
Atropa belladonna	D2	2,2 mg
Bellis perennis	D2	1,1 mg
Calendula officinalis	D2	2,2 mg
Echinacea	D2	0,55 mg
Echinacea purpurea	D2	0,55 mg
Hamamelis virginiana	D1	0,22 mg
Hepar sulfuris	D6	2,2 mg
Hypericum perforatum	D2	0,66 mg
Matricaria recutita	D3	2,2 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni	D6	1,1 mg
Symphytum officinale	D6	2,2 mg

- Други съставки (помощни вещества): вода за инжекции, натриев хлорид.

Как изглежда Траумил S и какво съдържа опаковката

Ампули от безцветно стъкло тип I (2,2 ml) с маркировка цветна точка, 2 вложки по 5 ампули, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Германия

Phone: 0049 (0)7221 501 00, Fax: 0049 (0)7221 501 485

Дата на последно преразглеждане на листовката 02/2023

