

Листовка: информация за потребителя  
разрешение № RGI HA7/7b-6134  
от 09-01-2023

Тридерм 0,5 mg/10 mg/1 mg/g крем  
бетаметазон/клотримазол/гентамицин

Triderm 0,5 mg/10 mg/1 mg/g cream  
betamethasone/clotrimazole/gentamicin

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

#### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Тридерм крем и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Тридерм крем
3. Как да използвате Тридерм крем
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тридерм крем
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### 1. Какво представлява Тридерм крем и за какво се използва

Комбинацията от активните вещества в Тридерм крем е предназначена за облекчаване на възпалителни прояви и оплакванията, свързани с повлияващи се от кортикостероидна терапия дерматози, при налични или подозирани вторични инфекции с бактерии или гъбички.

#### 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Тридерм крем

##### Не използвайте Тридерм крем

- ако сте алергични към някое от активните вещества: бетаметазон, клотримазол или гентамицин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- ако сте алергични към други продукти, съдържащи кортикоステроиди.

##### Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Тридерм крем

- за всички други придружаващи заболявания, ако има такива
- ако Вие сте бременна или кърмите.

Тридерм крем не трябва да се употребява върху големи участъци от тялото или под оклузивна (покриваща) превръзка, тъй като това може да доведе до абсорбция на по-голямо количество от активните вещества.

Не употребявайте лекарството по-често или за по-дълго време отколкото Ви е предписан Вашият лекар.

Веднага уведомете Вашия лекар, ако кожното заболяване се влоши или възникне нова инфекция.



Лекарството е предназначено само за кожно приложение. Да не се прилага в очите.

Свържете се с Вашия лекар, ако имате замъглено зрение или други зрителни смущения.

**Други лекарства и Тридерм крем**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

**Бременност и кърмене**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

**Шофиране и работа с машини**

Неприложимо.

**Важна информация относно никон от съставките на Тридерм крем**

Това лекарство съдържа 100 mg пропиленгликол във всеки грам крем. Пропиленгликолът може да причини дразнене на кожата. Тъй като това лекарство съдържа пропиленгликол, не го използвайте при отворени рани или големи участъци увредена или наранена кожа (като изгаряния) без да сте говорили с Вашия лекар или фармацевт.

Съдържа цетостеарилов алкохол. Може да причини локални кожни реакции (например контактен дерматит).

Това лекарство съдържа 10 mgベンзилов алкохол във всеки грам крем. Бензиловият алкохол може да причини алергични реакции или леко локално дразнене.

**3. Как да използвате Тридерм крем**

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Два пъти дневно (сутрин и вечер) нанасяйте тънък слой от Тридерм крем върху засегнатия участък и зоната около него и леко масажирайте.

Не прилагайте превръзки и не покривайте кожата по друг начин, освен ако Вашият лекар не ви препоръчва.

**Ако сте използвали повече от необходимата доза Тридерм крем**

Прилагайте само дозата, определена от Вашия лекар. Ако сте използвали повече от необходимата доза Тридерм или за по-дълъг период от предписания, незабавно уведомете Вашия лекар.

**Ако сте пропуснали да използвате Тридерм крем**

Ако забравите да използвате Тридерм крем, приложете лекарството веднага щом си спомните за това, след което продължете по обичайната схема.

**Ако сте спрели употребата на Тридерм крем**

Вашият лекар ще ви посъветва кога и как да преустановите лечението с Тридерм крем.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

**4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



Съобщава се за следните локални нежелани реакции: парене, щипене, сърбеж, дразнене, сухота, повищено окосмяване, акне, промяна в цвета на кожата, обезцветяване на кожата, зачеряване на кожата на лицето, кожни инфекции, изтъняване на кожата с повишена ранимост, поява на стрии, мехурчета, уртици по кожата или замъглено зрение.

Когато лекарството се прилага при деца или юноши, те трябва да се проследяват от лекуващия лекар редовно, тъй като част от лекарствените вещества се абсорбират през кожата и могат да повлият растежа или да доведат до други нежелани ефекти.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изгълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### **5. Как да съхранявате Тридерм крем**

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелзан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлят лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

##### **Какво съдържа Тридерм крем**

- Активните вещества са: 0,5 mg/g бетаметазон (като 0,64 mg бетаметазонов дипропионат), 10 mg/g клотrimазол и 1 mg/g гентамицин (като гентамицинов сулфат)
- Другите съставки са: течен парафин, бял мек парафин, цетостеарилов алкохол, пропиленгликол, макрогол цетостеарилетер,ベンзилов алкохол, натриев дихидрогенфосфат дихидрат, фосфорна киселина, натриев хидроксид, пречистена вода.

##### **Как изглежда Тридерм крем и какво съдържа опаковката**

Лекарството се предлага в алюминиеви туби, съдържащи 15 g крем.

Всяка туба, заедно с информационна листовка е поставена в картонена опаковка.

##### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

##### **Притежател на Разрешението за употреба**

N.V. Organon  
Kloosterstraat 6  
5349 AB Oss  
Нидерландия



Производител

Organon Heist bv  
Industriepark 30  
2220 Heist-op-den-Berg  
Белгия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

**България**  
Органон (И.А.) Б.В. - клон България  
Tel.: +359 2 806 3030  
[dproc.bulgaria@organon.com](mailto:dproc.bulgaria@organon.com)

**Дата на последно преразглеждане на листовката .**

