

Листовка: информация за пациента

20120502

RG/144744-56262

Триофлен 300 mg твърди капсули

08. 10. 2021

Trioflen 300 mg hard capsules

трифлусал (triflusal)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признанияте на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Триофлен и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Триофлен
3. Как да приемате Триофлен
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Триофлен
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Триофлен и за какво се използва

Триофлен принадлежи към група лекарства наречени тромбоцитни антиагреганти, те действат като предотвратяват образуването на съсиреци (тромби), които могат да запушат кръвоносните съдове. Това лекарство се използва за да се намали риска от повторен миокарден инфаркт, стабилна или нестабилна форма на стенокардия (ангина пекторис) или мозъчен инфаркт, при пациенти, които страдат или са прекарали някои от тези заболявания. Използва се също при пациенти, на които е правена сърдечна операция за поставяне на байпас.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Триофлен

Не приемайте Триофлен

- ако сте алергични към трифлусал или салицилати;
- ако имате или сте имали язва на stomахa или дванайсетопръстника;
- ако имате заболяване съпроводено с кръвоизлив.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемате Триофлен

- Ако имате чернодробна или бъбречна недостатъчност;
- Ако сте изложен на риск от кървене причинен от травма или други патологични състояния или сте приемали продължително време нестероидни противовъзпалителни лекарства (лекарства използвани за лечение на мускулна или обща болка и/или възпаление);



- Ако имате насрочена планова операция. В този случай рискът от кървене трябва да се оцени и ако е необходимо да спрете приема на Триофлен 7 дни преди операцията.

Деца и юноши

Безопасността и ефикасността при лица под 18 години не е установена и поради тази причина употребата в тази възрастова група не се препоръчва.

Други лекарства и Триофлен

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Определени лекарства могат да взаимодействват с трифлусал, в резултат на което може да се наложи корекция на дозата или прекъсване на лечението. Важно за Вас е да информирате Вашият лекар, ако приемате някои от следните лекарства: нестероидни противовъзпалителни, перорални антидиабетни или перорални антикоагуланти, тъй като ефектите на тези лекарства може да се засилят, включително и тези на трифлусал.

Триофлен с храна, напитки и алкохол

Приемането на Триофлен с храна намалява вероятността от поява на стомашно-чревни нежелани реакции.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не са съобщавани никакви ефекти на ТРИОФЛЕН, които могат да повлият способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Триофлен

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е две капсули Триофлен (съответстващи на 600 mg трифлусал) еднократно на ден или разделена на два приема, или три капсули (съответстващи на 900 mg трифлусал) разделени на три приема.

Триофлен се приема през устата.

Приемайте капсулите с достатъчно количество течност, за предпочитане по време на хранене.

Употреба при деца и юноши

Безопасността и ефикасността при лица под 18 години не е установена и поради тази причина употребата в тази възрастова група не се препоръчва.

Ако сте използвали повече Триофлен, отколкото трябва:

Ако сте приели доза, по-голяма от предписаната, посъветвайте се с лекувания си лекар.

Търде високи дози трифлусал може да причинят замаяност, двойно виждане, затруднение в говора, съниливост, летаргия и диария.

Ако сте пропуснали да използвате Триофлен

Ако сте пропуснали да вземете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, вземете я както обикновено, като пропуснете дозата, която сте забравили. Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате забравената. Продължете да използвате лекарството, както ви е предписано от лекувания Ви лекар.



Ако сте спрели употребата на Триофлен

Не спирайте употребата на Триофлен преди да сте се обърнали към Вашия лекар за това.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Най-честата нежелана реакция е тежест в stomахa.

За оценка на честотата на нежеланите реакции се приемат следните критерии:

Много чести – повече от 1 на 10 лекувани пациенти;

Чести – по-рядко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани пациенти;

Нечести – по-рядко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 лекувани пациенти;

Редки – по-рядко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10000 лекувани пациенти;

Много редки – по-рядко от 1 на 10000 лекувани пациенти, включително изолирани случаи.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан: Нечести: сърбеж/зачеряване.

Нарушения на нервната система: Чести: главоболие; Нечести: объркване, виене на свят, замаяност, припадъци.

Нарушения на ухото и лабиринта: шум в ушите, намалена слухова чувствителност.

Специфични сетива: Нечести: промяна на вкуса.

Стомашно-чревни нарушения: Много чести: диспепсия; Чести: абдоминална болка, гадене, запек, повръщане, флатуенция, анорексия; Нечести: диария, кървене, мелена.

Сърдечни нарушения: Нечести: хипертония.

Съдови нарушения: Нечести: транзиторни исхемични атаки, мозъчен кръвоизлив.

Респираторни нарушения: Нечести: диспнея, инфекция на горните дихателни пътища.

Нарушения на кръвта, еритроцити: Нечести: анемия.

Нарушения на кръвта, тромбоцити и съсиране: Нечести: кръвотечение от носа, хематом, пурпура, кръвотечение от венците.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища: Нечести: кръв в урината, инфекция на уринарния тракт.

Общи нарушения: Нечести: подуване на корема вследствие на образуване на газове или събиране на течности в stomахa и червата, треска, грипо-подобни симптоми.

Описани са изолирани случаи на реакции на фоточувствителност.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или, фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изгълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Триофлен

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25° C.



Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност отбелаязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлят лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Триофлен

Активното вещество в Триофлен е трифлусал. Всяка капсула съдържа 300 mg трифлусал. Останалите вещества (желатин) влизат в състава на твърдата капсула.

Как изглежда Триофлен и какво съдържа опаковката

Твърди желатинови капсули опаковани в алюминиеви PVC/PVDC блистери. Картонени кутии съдържащи 30 или 60 твърди капсули, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба
УНИФАРМА ООД,
ул. Хан Тервел № 7, София 1517, България

Производител
TOLL MANUFACTURING SERVICES S.L.
C/ Aragoneses, 2-28108- Alcobendas (Madrid), Испания

Дата на последно преразглеждане на листовката
09/2021

