

ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Листовка - Приложение 2

Към Рев. №

9600183

Троксерутин Софарма 2% гел

Troxerutin Sopharma 2% gel Разрешение № BG/НА/НР/ 46482
троксерутин (troxerutin)

Одобрение № / 11 - 07 - 2019

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

В тази листовка

1. Какво представлява Троксерутин Софарма гел и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Троксерутин Софарма гел
3. Как да използвате Троксерутин Софарма гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Троксерутин Софарма гел
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Троксерутин Софарма гел и за какво се използва

Троксерутин Софарма гел съдържа активно вещество троксерутин, което принадлежи към група лекарства, наречени капиляротонични. Троксерутин притежава венотонизиращо, противовъзпалително и противооточно действие. Притежава антиоксидантна активност. В резултат на лечението с троксерутин се намалява подуването на краката и свързаните с него симптоми. Троксерутин Софарма гел е предназначен за локално симптоматично лечение при хронична венозна недостатъчност; варикозно разширени вени; повърхностен тромбофлебит, перифлебит и флеботромбоза; посттромботичен синдром; посттравматичен оток, хематоми.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Троксерутин Софарма гел

Не използвайте Троксерутин Софарма гел:

- ако сте алергични към троксерутин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Троксерутин Софарма гел.

Продължителното прилагане на лекарствения продукт може да доведе до прояви на свръхчувствителност на мястото на приложението.

Други лекарства и Троксерутин Софарма гел

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, насърко сте приемали или възможно да приемате други лекарства.

При прилагане на Троксерутин Софарма гел не са наблюдавани клинично значими лекарствени и други взаимодействия.



Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Троксерутин Софарма под формата на гел може да се употребява по време на бременност и в периода на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Троксерутин Софарма гел е лекарствена форма за локално приложение. Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Троксерутин Софарма гел съдържаベンзалкониев хлорид

Бензалкониевият хлорид може да причини дразнене на кожата.

Не трябва да прилагате това лекарство върху гърдите ако кърмите, защото бебето може да го поеме с кърмата.

3. Как да използвате Троксерутин Софарма гел

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Опитайте се да прилагате лекарството по едно и също време всеки ден.

Гелът се нанася сутрин и вечер, като внимателно се втрива с леки масажни движения върху засегнатите участъци от кожата. Ако е необходимо може да се прилага и под превръзка и стегнат чорап.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Троксерутин Софарма гел

При локално приложение на продукта е малко вероятно да се появи предозиране. При случайно поглъщане на големи количества е необходимо да се приложат общи мерки за елиминиране и провеждане на симптоматично лечение.

Ако сте пропуснали да използвате Троксерутин Софарма гел

Ако сте пропуснали да приложите лекарството и наблизава времето за следващата доза, приложете го както обикновено. Не използвайте двойно количество от лекарството при следващото приложение.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Като правило лекарствения продукт се понася добре.

В редки случаи и при продължителна употреба е възможно зачеряване на кожата и сърбеж.

Ако оплакванията продължават или състоянието Ви се влошава, обърнете се към лекар!

5. Как да съхранявате Троксерутин Софарма гел

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

След отваряне на тубата гелът може да се използва до 12 месеца.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация



Какво съдържа Троксерутин Софарма гел

В 1 g гел се съдържа активно вещество троксерутин (troxerutin) 20 mg.

Другите съставки са: карбомери, динатриев едетат, бензалкониев хлорид, натриев хидроксид, пречистена вода.

Как изглежда Троксерутин Софарма гел и какво съдържа опаковката

Жълта желеобразна маса без мирис.

40 g гел в мембрани алуминиеви туби с капачки от полиетилен, по 1 туба в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

СОФАРМА АД

ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Дата на последно преразглеждане на листовката: март 2019.

