

Листовка: информация за пациентъ

Улкопрол 20 mg твърди стомашно-устойчиви капсули
Ulcoprol 20 mg hard gastro-resistant capsules

омепразол/омергazole

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаките на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Улкопрол и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Улкопрол
3. Как да приемате Улкопрол
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Улкопрол
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Улкопрол и за какво се използва

Стомашно-устойчивите капсули Улкопрол съдържат активна съставка, наречена омепразол. Той принадлежи към група лекарства, наречени „инхибитори на протонната помпа“. Те действат като намаляват количеството киселина, образувано в стомаха Ви.

Улкопрол се използва за лечение на следните състояния:

При възрастни:

- „гастроезофагеална рефлуксна болест“ (GERB). Това е състояние, при което киселина от стомаха навлиза в хранопровода („тръбата“, свързваща гърлото със стомаха) и причинява болка, възпаление и парене зад гръдената кост;
- язви в горната част на тънкото черво (язва на дванадесетопръстника) или стомаха (язва на стомаха);
- язви, които се дължат на инфекция с бактерия, наречена „*Helicobacter pylori*“. Ако имате това състояние, Вашият лекар може да Ви предпише и антибиотици, които да излекуват инфекцията и да позволят на язвата да зарастане.
- язви, чието развитие е причинено от прием на лекарства, наречени НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства). Ако приемате НСПВС, Улкопрол може да се използва и за предотвратяване на развитието на язви.
- отделяне на твърде голямо количество киселина в стомаха, дължащо се на образование в панкреаса (синдром на Zollinger-Ellison).



При деца:

Деца на възраст над 1 година и с тегло $\geq 10 \text{ kg}$

- „Гастроезофагеална рефлуксна болест“ (GERB). Това е състояние, при което киселина от стомаха навлиза в хранопровода („търбата“, свързваща гърлото със стомаха) и причинява болка, възпаление и парене зад гръдената кост.

При деца симптомите на това състояние могат да включват връщане на стомашно съдържимо в устата (регургитация), гадене и забавено наддаване на тегло.

Юноши и деца на възраст над 4 години

- Язви, които се дължат на инфекция с бактерия, наречена „*Helicobacter pylori*“. Ако Вашето дете има това състояние, Вашият лекар може да предпише и антибиотики, които да излекуват инфекцията и да позволяят на язвата да зарасне.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Улкопрол

Не приемайте Улкопрол

- ако сте алергични към омепразол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- ако сте алергични към други инхибитори на протонната помпа (напр. пантопразол, ланзопразол, рабепразол, езомепразол).
- ако приемате лекарство, съдържащо нелфинавир (използва се при инфекция с HIV).

Ако не сте сигурни, преди да приемете Улкопрол говорете със своя лекар или фармацевт.

Предупреждения и предпазни мерки

Уведомете Вашия лекар, преди да приемете Улкопрол, ако:

- трябва да си направите определен вид изследване на кръвта (Хромогранин A). Той ще прекрати временно лечението Ви с омепразол пет дни преди изследването;
- някога сте получавали кожна реакция след лечение с лекарство, подобно на Улкопрол, което намалява стомашната киселина.

Ако получите обрив по кожата, особено в участъци, изложени на слънце, информирайте Вашия лекар веднага когато Ви бъде възможно, тъй като може да се наложи да спрете лечението с Улкопрол. Не забравяйте също да споменете всички други неблагоприятни последствия, като болка в ставите.

Улкопрол може да прикрие симптомите на други заболявания. Поради това, ако някое от изброените по-долу Ви се е случило преди да започнете да приемате Улкопрол или по време на приема му, веднага се свържете с лекаря си:

- Ако загубите много тегло без видима причина или имате затруднено прегълъдане.
- Ако имате болки в корема или лошо храносмилане.
- Ако започнете да повръщате храна или кръв.
- Ако изпражненията ви станат черни (кървави).
- Ако развиете тежка или продължителна диария, понеже омепразол е свързан с леко повишаване на честотата на развитие на инфекциозни диарии.
- Ако имате сериозни проблеми с черния дроб.

При продължителен прием на Улкопрол (над 1 година) вероятно Вашият лекар редовно ще проследява състоянието Ви. Когато се срещате с него, трябва да му съобщавате за всеки нов и необикновен симптом или обстоятелство.



Приемът на инхибитори на протонната помпа, като Улкопрол може слабо да повиши риска от счупвания на бедрената кост, костите на китката или прешлените на гръбначния стълб. Уведомете Вашия лекар, ако страдате от остеопороза или ако приемате кортикоステроиди (което може да увеличи риска от остеопороза).

Когато приемате омепразол, може да възникне възпаление в бъбреците Ви. Признаците и симптомите може да включват намален обем на урината или кръв в урината и/или реакции на свръхчувствителност като повишена температура, обрив и скованост в ставите. Трябва да съобщите на лекуващия лекар за тези признания.

Други лекарства и Улкопрол

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, накърно сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Причината за това е, че Улкопрол може да окаже влияние върху действието на някои лекарства, а също така някои лекарства могат да повлият действието на Улкопрол.

Не приемайте Улкопрол, ако използвате лекарство, съдържащо нелфинавир (използва се за лечение на инфекция с HIV).

Уведомете лекаря или фармацевта си, ако приемате някое от изброените по-долу лекарства:

- кетоконазол, итраконазол, позаконазол или вориконазол (използват се за лечение на инфекции, причинени от гъбички);
- дигоксин (използва се за лечение на заболявания на сърцето);
- диазепам (използва се при повышен мускулен тонус или за лечение на епилепсия);
- фенитоин (използва се за лечение на епилепсия). Ако приемате фенитоин, Вашият лекар ще трябва да Ви следи в началото и в края на лечението с Улкопрол;
- лекарства, които се използват за намаляване на съсирането на кръвта Ви – като варфарин и други блокери на витамин K. Може да се налага Вашият лекар да Ви следи в началото и в края на лечението с Улкопрол;
- рифампицин (използва се за лечение на туберкулоза);
- атазанавир (използва се за лечение на инфекция с HIV);
- таクロлимус (използва се при трансплантиране на органи);
- жълт кантарион (*Hypericum perforatum*) (използва се за лечение на лека депресия);
- цилостазол (използва се за лечение на клаудикацио интермитенс);
- саквинавир (използва се за лечение на инфекция с HIV);
- клопидогрел (използва се за намаляване на риска от развитие на кръвни съсиреци – тромби);
- ерлотиниб (използва се за лечение на рак);
- метотрексат (химиотерапевтик, който във високи дози се използва за лечение на рак) – ако приемате високи дози метотрексат Вашият лекар може временно да преустанови лечението с омепразол.

Ако Вашият лекар Ви е предписал едновременно с Улкопрол да приемате и антибиотиците амоксицилин и кларитромицин, използвани за лечение на инфекция с *Helicobacter pylori*, е много важно да го уведомите, ако приемате каквито и да е други лекарства.

Улкопрол с храни, напитки и алкохол

Можете да приемате капсулите както след хранене, така и на гладно.

Бременност, кърмене и фертилитет

Преди да започнете да приемате Улкопрол, уведомете лекаря си, ако сте бременна или троодихвате да забременеете. Вашият лекар ще реши дали в това време можете да приемате Улкопрол.



Ако кърмите, Вашият лекар ще реши дали можете да приемате Улкопрол.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква Улкопрол да повлияе способността Ви да шофирате или да работите с инструменти или машини. Могат да се развият нежелани реакции като замайване и нарушения на зрението (вижте точка 4). Ако такива се развият, не трябва да шофирате или да работите с машини.

Улкопрол съдържа захар и натрий

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на капсула, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

3. Как да приемате Улкопрол

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Вашият лекар ще ви каже колко капсули да приемате и колко дълго да ги приемате. Това зависи от състоянието Ви и от възрастта Ви.

Обичайните дозировки са дадени по-долу.

Възрастни:

За лечение на симптоми на ГЕРБ като парене зад гръдената кост и регургитация на стомашни киселини:

- Ако Вашият лекар е установил, че хранопроводът Ви е засегнат леко, обичайната дозировка е 20 mg еднократно дневно в продължение на 4-8 седмици. Вашият лекар може да Ви каже да продължите приема в доза 40 mg в продължение на още 8 седмици, ако хранопроводът Ви не е оздравял напълно.
- След като хранопроводът оздравее, обичайната дозировка е 10 mg еднократно дневно.
- Ако хранопроводът Ви не е увреден, обичайната дозировка е 10 mg еднократно дневно.

За лечение на язви в горната част на тънкото черво (язва на дванадесетопърстника):

- Обичайната дозировка е 20 mg еднократно дневно в продължение на 2 седмици. Вашият лекар може да Ви каже да продължите приема в същата доза в продължение на още 2 седмици, ако язвата Ви все още не е оздравяла.
- Ако язвата не оздравее напълно, дозировката може да бъде повишена до 40 mg еднократно дневно в продължение на 4 седмици.

За лечение на язви в стомаха (стомашна язва):

- Обичайната дозировка е 20 mg еднократно дневно в продължение на 4 седмици. Вашият лекар може да Ви каже да продължите приема в същата доза в продължение на още 4 седмици, ако язвата Ви все още не е оздравяла.
- Ако язвата не оздравее напълно, дозировката може да бъде повишена до 40 mg еднократно дневно в продължение на 8 седмици.



За предотвратяване на повторно развитие на язви на дванадесетопръстника и стомаха:

- Обичайната дозировка е 10 mg и 20 mg еднократно дневно. Вашият лекар може да повиши дозировката до 40 mg еднократно дневно.

За лечение на язви на стомаха и дванадесетопръстника, причинени от НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства):

- Обичайната дозировка е 20 mg еднократно дневно в продължение на 4–8 седмици.

За предотвратяване на развитието на язви на дванадесетопръстника и стомаха, ако приемате НСПВС:

- Обичайната дозировка е 20 mg еднократно дневно.

За лечение на язви, причинени от инфекция с *Helicobacter pylori* и за предотвратяване на повторното им развитие:

- Обичайната дозировка е 20 mg Улкопрол два пъти дневно в продължение на една седмица.
- Освен това Вашият лекар ще ви предпише прием на два от следните антибиотици: амоксицилин, кларитромицин и метронидазол.

При отделяне на твърде голямо количество киселина в стомаха, дължащо се на образуване в панкреаса (синдром на Zollinger-Ellison):

- Обичайната дозировка е 60 mg дневно.
- Вашият лекар ще уточни дозировката Ви в зависимост от Вашите нужди и също така ще прецени колко време трябва да приемате лекарството.

Деца:

За лечение на симптоми на ГЕРБ като парене зад гръдената кост и регургитация на стомашни киселини:

- Улкопрол могат да приемат деца на възраст над 1 година и с телесно тегло над 10 kg. Дозировката при деца се определя в зависимост от телесното им тегло, така че Вашият лекар ще прецени каква е правилната доза.

За лечение на язви, причинени от инфекция с *Helicobacter pylori* и за предотвратяване на повторното им развитие:

- Улкопрол могат да приемат деца на възраст над 4 години. Дозировката при деца се определя в зависимост от телесното им тегло, така че Вашият лекар ще прецени каква е правилната доза.
- Освен това Вашият лекар ще предпише на детето Ви прием на два от следните антибиотици: амоксицилин, кларитромицин и метронидазол.

Как да приемате това лекарство

- Препоръчва се да приемате капсулите сутрин.
- Можете да приемате капсулите след хранене или на гладно.
- Погълщайте капсулите цели с половин чаша вода. Не дъвчете или разтроявайте капсулите. Причината за това е, че капсулите съдържат обвити пелети, които пречат на стомашните киселини да разградят лекарството. Важно е целостта на пелетите да не бъде нарушена.

Какво да направите, ако Вие или Вашето дете имате проблеми с гълтането на капсулите
Ако Вие или детето Ви имате проблеми с гълтането на капсулите:

- Отворете капсулата и прегълнете директно съдържанието с половин чаша вода или по желание съдържанието в чаша негазирана вода или някакъв кисел плодов сок (например от ябълка, портокал или ананас) или ябълково пюре.



- Винаги разбърквайте сместа непосредствено преди да я изпийте (разтворът не е бистър). След това изпийте сместа веднага или в рамките на 30 минути.
- За да сте сигурни, че сте изпили цялото лекарство, изплакнете добре чашата, като я напълните наполовина с вода и я изпийте. Твърдите частици съдържат лекарство - не ги дъвчете или смачквайте.

Ако сте приели повече от необходимата доза Улкопрол

Ако сте приели по-голяма от предписаната Ви от Вашия лекар доза Улкопрол, веднага се свържете със своя лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Улкопрол

Ако забравите да приемете една доза, приемете я веднага, щом си спомните. Ако обаче наближава време да приемете следващата си доза, пропуснете забравената. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако забележите някоя от изброените редки, но сериозни нежелани реакции, веднага спрете да приемате Улкопрол и незабавно се свържете с лекар:

- Внезапна появя на хрипове, подуване на устните, езика, гърлото или цялото Ви тяло, обриви, загуба на съзнание или затруднено прегълъщане (тежка алергична реакция).
- Зачеряване на кожата с образуване на мехури или белене. Също така могат да се появят мехури и кървене от устните, очите, устата, носа и гениталиите. Това може да бъде „синдром на Стивънс-Джонсън“ или „токсична епидермална некролиза“.
- Пожълтяване на кожата, потъмняване на урината и отпадналост, които могат да са симптоми на проблеми с черния дроб.

Другите нежелани реакции са:

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти)

- главоболие;
- ефекти върху стомаха или червата: диария, болки в корема, запек, газове (флатуленция);
- гадене или повръщане;
- доброкачествени полипи в стомаха.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти)

- отичане на краката и глезените;
- нарушения на съня (бесъние);
- замайване, изтръпане, „мравучкане“, сънливост;
- световъртеж (вертиго);
- промени в кръвните показатели, които показват как функционира черният дроб;
- кожни обриви, надигнати обриви (копривна треска, уртикария) и кожен сърбеж;
- общо неразположение и липса на енергия;
- счупвания на бедрената кост, костите на китката и прешлените на гръбначния стълб.



Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти)

- проблеми с кръвта като понижен брой бели кръвни клетки или тромбоцити. Това може да предизвика отпадналост, кръвонасядания или повишаване на риска от инфекции;
- алергични реакции, понякога много тежки, включително подуване на устните, езика и гърлото, повишена температура, хрипове;
- понижаване на натрия в кръвта. Това може да предизвика отпадналост, повръщане и крампи;
- тревожност, обърканост или депресия;
- промяна на вкуса;
- проблеми със зрението – като замъглено зрение;
- внезапна поява на хрипове или задух (бронхоспазъм);
- сухота в устата;
- възпаление в устата;
- инфекция, наречена „кандидоза”, която може да засегне червата и която се причинява от гъбичка;
- възпаление на червата, водещо до диария;
- проблеми с черния дроб, включително иктер – пожълтяване на кожата, потъмняване на урината и отпадналост;
- окапване на косата (алопеция);
- кожни обриви при излагане на слънце;
- болки в ставите (артралгия) или в мускулите (миалгия);
- сериозни проблеми с бъбреците (тубулоинтерстициален нефрит);
- повишено потене.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти)

- промени в кръвната картина, включително агранулоцитоза (липса на бели кръвни клетки);
- агресивно поведение;
- видждане, усещане или чуване на несъществуващи неща (халюцинации);
- сериозни проблеми с черния дроб, водещи до чернодробна недостатъчност и мозъчно възпаление;
- внезапно развитие на тежък обрив или белеща се кожа. Това може да е свързано с висока температура и болки в ставите (еритема мултиформе, синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза);
- мускулна слабост;
- уголемяване на гърдите при мъже.

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни)

- понижени стойности на магнезий в кръвта. Ако провеждате лечение с Улкопрол за повече от три месеца е възможно стойностите на магнезий в кръвта Ви да се понижат. Симптомите при ниски стойности на магнезий могат да бъдат умора, неволеви мускулни съкращения, дезориентация, гърчове, виене на съят, повишена сърдечна честота. Ако почувствате някой от тези симптоми, моля уведомете Вашия лекар незабавно. Ниските стойности на магнезий могат също да доведат и до понижаване на стойностите на калий или калций в кръвта. Вашият лекар може да Ви назначи редовно провеждане на кръвни тестове, за да наблюдава стойностите на магнезия в кръвта Ви;
- обрив, който може да бъде съпроводен с болка в ставите.

В много редки случаи Улкопрол може да засегне белите кръвни клетки, което да причини развитие на имунен дефицит. Ако имате инфекция със симптоми като повишена температура и влошено общо състояние или повишена температура със симптоми на локална инфекция като болки във врата, гърлото или устата, или затруднено уриниране, максимално бързо трябва да се

консултирате с лекар, за да може чрез изследване на кръв да се изключи възможността броят на белите Ви кръвни клетки да е понижен (агранулоцитоза). В такъв случай е важно да дадете информация за лекарството си.

Не се притеснявайте от този списък с възможни нежелани реакции. Може да не развиете нито една от тях.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Улкопрол

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелаян върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Улкопрол

- Активно вещество: омепразол. Всяка твърда стомашно-устойчива капсула съдържа 20 mg омепразол.
- Другите съставки са:
Състав на пелетите: лек магнезиев карбонат, хидроксипропилцелулоза, динатриев хидрогенфосфат дихидрат, царевично нишесте, талк, захар за фармацевтични цели, инертни ядра от нишесте и захар, хидроксипропилметилцелулоза, съполимер на метакрилова киселина и етилакрилат (1:1), титанов диоксид, полисорбат 80, полиетиленгликол 6000, колоиден, безводен силициев диоксид, натриев хидроксид (за корекция на pH).
Състав на твърдата желатинова капсула: желатин, титанов диоксид, червен железен оксид, жълт железен оксид.

Как изглежда Улкопрол и какво съдържа опаковката

Описание

Улкопрол 20 mg са твърди желатинови капсули с бяло тяло и оранжева капачка. Капсулно съдържимо – пелети с бял до почти бял цвят.

Видове опаковки

Капсули по 10 броя в блистер от PVC/PVDC/Al фолио, по 3 блистера в картонена кутия.

Капсули по 7 броя в блистер от Al/Al фолио, по 2 и по 4 блистера в картонена кутия.



Притежател на разрешението за употреба
Тева Фарма ЕАД
ул. „Люба Величкова“ № 9, 1407 София
България

Производители:
Балканфарма-Дупница АД
ул. „Самоковско шосе“ № 3
2600 Дупница
България

Балканфарма-Разград АД
бул. „Априлско въстание“ 68
7200 Разград
България

Дата на последно преразглеждане на листовката – 02/2023

N005

