

Листовка: информация за пациента

УНИРЕКС® КАРДИО 75 mg диспергиращи се таблетки
ацетилсалицилова киселина

UNIREX® CARDIO 75 mg dispersible tablets
Acetylsalicylic acid

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте т. 4.
- Ако след 3-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява УНИРЕКС КАРДИО 75 mg и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете УНИРЕКС КАРДИО 75 mg
3. Как да приемате УНИРЕКС КАРДИО 75 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате УНИРЕКС КАРДИО 75 mg
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ЛЕКОВИТЕ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20130297
Разрешение №	66/МА/МР-4280
Дата на издаване	18-09-2018

1. Какво представлява УНИРЕКС КАРДИО 75 mg и за какво се използва

За предотвратяване на кардио-васкуларен риск от инфаркт на миокарда и инсулт при пациенти с прекарани кардио-васкуларни инциденти, нестабилна стенокардия или инсулт, както и след хирургична интервенция с направен байпас.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете УНИРЕКС КАРДИО 75 mg

Не приемайте УНИРЕКС КАРДИО 75 mg:

- ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете УНИРЕКС КАРДИО 75 mg, ако страдате от

пептична язва, хемофилия, чернодробно или бъбречно заболяване, дехидратация, алергия или подагра. Преди да приемате ацетилсалицилова киселина за продължително време с цел предотвратяване на кардио-васкуларен или cerebro-васкуларен риск, първо трябва да се консултирате с лекар, който ще обясни ползите и рисковете за всеки индивидуален случай.

Деца и юноши

УНИРЕКС КАРДИО 75 mg е предназначен за възрастни и юноши над 16 год. възраст. При деца е установена взаимовръзка между приема на ацетилсалицилова киселина и синдрома на Рей. Синдромът на Рей е много рядко заболяване, което може да бъде и фатално.

Други лекарства и УНИРЕКС КАРДИО 75 mg

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, особено такива за лечение на подагра, лекарства за разреждане на кръвта, метотрексат (за лечение на онкологично заболяване или псориазис).



диуретици, ацетазоламид, метоклопрамид, стероидни лекарства или лекарства за подпомагане на храносмилането. При посещение на лекар или постъпване в болница, винаги съобщавайте какви лекарства приемате.

УНИРЕКС КАРДИО 75 mg с храна, напитки и алкохол

Препоръчва се приема на УНИРЕКС КАРДИО 75 mg да става по време на хранене или след хранене.

Не се препоръчва УНИРЕКС КАРДИО 75 mg да се приема едновременно с алкохол.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Не се препоръчва приема на УНИРЕКС КАРДИО 75 mg по време на бременност, кърмене или ако планирате бременност.

Шофиране и работа с машини

УНИРЕКС КАРДИО 75 mg не повлиява концентрацията и способността за шофиране и работа с машини.

УНИРЕКС КАРДИО 75 mg съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате УНИРЕКС КАРДИО 75 mg

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза при възрастни и деца над 16 години е по 1 таблетка (75 mg) дневно разтворена в чаша вода. За препоръчване е да се приема по време или веднага след хранене.

Употреба при деца и юноши

УНИРЕКС КАРДИО 75 mg не бива да се приема от деца под 16 годишна възраст, освен ако не е изрично предписан от лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза УНИРЕКС КАРДИО 75 mg

Ако вие или някой друг, случайно или преднамерено приемете повече таблетки наведнъж, или ако се съмнявате, че дете е приело някоя таблетка, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар или с най-близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете УНИРЕКС КАРДИО 75 mg

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте забравили да приемете таблетката, вземете я веднага щом се сетите, освен ако не е наближило времето за следващия прием.

Ако сте спрели приема на УНИРЕКС КАРДИО 75 mg

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



Ацетилсалицилова киселина се понася добре от много пациенти, но при някои може да предизвика нежелани ефекти, като дразнене на стомаха. Ако забележите кръв в изпражненията или те са черни, трябва незабавно да съобщите на Вашия лекар. При някои пациенти е възможно да се прояви по-дълго кървене на рани. При свръхчувствителни пациенти е възможно да се прояви затруднено дишане или обриви. Ацетилсалициловата киселина може да предизвика замаяност, обърканост, намален слух или шум в ушите. Вие трябва веднага да информирате Вашия лекар, ако забележите някои от посочените нежелани реакции или друг нежелан ефект.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. "Дамян Груев" № 8, 1303 София, тел. +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате УНИРЕКС КАРДИО 75 mg

Да се съхранява в оригиналната опаковка, при температура под 25°C на място, недостъпно за деца.

Период на използване след първоначално отваряне на опаковката – 6 месеца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа УНИРЕКС КАРДИО 75 mg

- Активното вещество е: ацетилсалицилова киселина 75 mg
- Другите съставки (помощни вещества) са: нишесте, лактоза, захарин натрий, безводна лимонена киселина, калциев карбонат, талк и натриев лаурил сулфат.

Как изглежда УНИРЕКС КАРДИО 75 mg и какво съдържа опаковката

Таблетките УНИРЕКС КАРДИО 75 mg са кръгли и бели. Продуктът се предлага по 100 таблетки в пластмасова опаковка със защитена капачка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

НАТУРПРОДУКТ ООД

бул. "Христофор Колумб" № 64, 1592 София, България

Reg. No: 20130297

Производител:

M&A Pharmachem Ltd,

Allenby Laboratories,

Wigan Road, Westhoughton,

Bolton BL5 2AL, Обединено Кралство

Дата на последно преразглеждане на листовката:

