

Листовка: информация за потребителя

УПСАВИТ Витамин С 1 g ефервесцентни таблетки

19. 04. 2021

Аскорбинова киселина

UPSAVIT Vitamin C 1 g effervescent tablets

Ascorbic acid

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, фармацевт или медицинка сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинка сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява УПСАВИТ Витамин С и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете УПСАВИТ Витамин С
3. Как да приемате УПСАВИТ Витамин С
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате УПСАВИТ Витамин С
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. **Какво представлява УПСАВИТ Витамин С и за какво се използва**

Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

УПСАВИТ Витамин С е показан за профилактика и лечение на състояния свързани с недостиг на Витамин С.

2. **Какво трябва да знаете, преди да приемете УПСАВИТ Витамин С**

Не приемайте УПСАВИТ Витамин С

- ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако се колебаете, консултирайте се с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете УПСАВИТ Витамин С.



Вследствие на леко стимулиращия ефект на витамин С, за предпочитане е лекарството да не се приема в края на деня.

Други лекарства и УПСАВИТ Витамин С

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

При болни от диабет УПСАВИТ Витамин С може да взаимодейства с реактивите, които се използват за изследване на кръвта и урината.

Едновременното приемане на високи дози аскорбинова киселина с дефероксамин, може да увеличи тъканното желязо до токсични нива и да доведе до сърдечна недостатъчност.

Чрез големи дози аскорбинова киселина и поради подкиселяване на урината се увеличава екскрецията на оксалати в урината.

Аскорбиновата киселина подпомага резорбцията на желязо в стомашно-чревния тракт.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Използването на УПСАВИТ Витамин С трябва да се предписва по време на бременност само при необходимост.

Да се избягва употребата на УПСАВИТ Витамин С по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

УПСАВИТ Витамин С не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

УПСАВИТ Витамин С съдържа сънсет жълто FCF (E110), натриев бензоат (E211), фруктоза, глюкоза, захароза и натрий.

Това лекарство съдържа азобагрило сънсет жълто FCF (E110) и може да причини алергични реакции.

Това лекарство съдържа 50 mg натриев бензоат (E211) във всяка ефервесцентна таблетка.

Това лекарство съдържа 2,63 mg фруктоза, 2,63 mg глюкоза и 628,38 mg захароза във всяка ефервесцентна таблетка. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

Това лекарство съдържа 284 mg натрий (основна съставка на готварската/трапезната сол) във всяка ефервесцентна таблетка. Това количество е еквивалентно на 14,15% от препоръчителния максимален дневен хранителен прием на натрий за възрастен.

3. Как да приемате УПСАВИТ Витамин С

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предназначено за възрастни.
Препоръчителната доза е 1 таблетка дневно.



Таблетката се разтваря в чаша с вода.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Това лекарство при някои хора може да доведе до нежелани реакции като болки в стомаха, диарии, трудности при уриниране или оцветяване на урината в оранжево. При появяване на някои от тези симптоми е необходимо да уведомите Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате УПСАВИТ Витамин С

Да се съхранява под 30°C.

Съхранявайте тубата плътно затворена, за да се предпази от влага.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа УПСАВИТ Витамин С

- Активното вещество е: аскорбинова киселина (Витамин С) 1 g
- Други съставки са: натриев хидроген карбонат, безводна лимонена киселина, захароза, захарин натрий, макрогол 6000, натриев бензоат (E211), аромат на портокал (съдържащ фруктоза, глюкоза и захароза), сънсет жълто FCF (E110).

Как изглежда УПСАВИТ Витамин С и какво съдържа опаковката

Кутия с 1 туба с 10 ефервесцентни таблетки.



Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

UPSA SAS
3, Rue Joseph Monier,
92500 Rueil-Malmaison,
Франция

Производител

UPSA SAS
304, avenue du Docteur Jean Bru
47000 Agen, Франция

или

UPSA SAS
979 Avenue des Pyrénées
47520 Le Passage, Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката 03/2021 г.

