

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВЕНОРУТОН 2% Гел

O-(β -хидроксиетил)-рутозиди

VENORUTON 2% Gel

O-(β -hydroxyethyl)-rutosides

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Към Рег. № 9960333

Разрешение № 20330, 23. 11. 2012

Одобрение № /

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както ви е казал вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява **ВЕНОРУТОН 2% Гел** и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате **ВЕНОРУТОН 2% Гел**
3. Как да използвате **ВЕНОРУТОН 2% Гел**
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **ВЕНОРУТОН 2% Гел**
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява **ВЕНОРУТОН 2% Гел** и за какво се използва

ВЕНОРУТОН 2% Гел съдържа като активна съставка 2% O-(β -хидроксиетил)-рутозиди, които принадлежат към групата медикаменти, наречени вазопротектори (предпазват вените и капилярите) за локално приложение.



ВЕНОРУТОН 2% Гел се използва за намаляване на отока и свързаните с хроничната венозна недостатъчност симптоми като болка, подути крайници, болка след склеротерапия или по време на продължителен полет.

ВЕНОРУТОН 2% Гел също се употребява, за да намали болката и отока от травматичен произход, като изкълчване и мускулна контузия.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ВЕНОРУТОН 2% Гел

Не използвайте ВЕНОРУТОН 2% Гел

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към 2% О-(β-хидроксиетил)-рутозиди или към някоя от останалите съставки на **ВЕНОРУТОН 2% Гел**, изброени в точка 6.

Други лекарства и ВЕНОРУТОН 2% Гел

Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или приемате други лекарства, включително лекарства или хранителни добавки, отпуснати без рецепта.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на **ВЕНОРУТОН 2% Гел**. В съответствие с общоприетите препоръки за безопасност **ВЕНОРУТОН 2% Гел** не трябва да се използва по време на първия триместър на бременността, освен след консултация с лекар.

Шофиране и работа с машини

ВЕНОРУТОН 2% Гел не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

ВЕНОРУТОН 2% Гел съдържа бензалкониев хидрохлорид - дразнещо вещество, което може да причини кожни реакции.

3. Как да използвате ВЕНОРУТОН 2% Гел

Винаги използвайте **ВЕНОРУТОН 2% Гел** точно както ви е казал вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е: две апликации дневно, приложени с лек масаж до пълното проникване, така че кожата да остане суха. Ако е необходимо, **ВЕНОРУТОН 2% Гел** може да се прилага под оклузивна или еластична превръзка.



Ако имате въпроси по отношение на това, колко дълго да използвате **ВЕНОРУТОН 2% Гел**, попитайте вашия лекар или фармацевт.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ВЕНОРУТОН 2% Гел

В случаите на инцидентно поглъщане на **ВЕНОРУТОН 2% Гел**, информирайте веднага вашия лекар.

Ако сте пропуснали да използвате ВЕНОРУТОН 2% Гел

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4. Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства, **ВЕНОРУТОН 2% Гел** може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои нежелани реакции са редки (могат да засегнат между 1 и 10 на всеки 10 000 човека).

Наблюдавани са редки случаи на отложени алергични реакции. Симптомите изчезват със спиране на лечението.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции след употреба на **ВЕНОРУТОН 2% Гел**, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате ВЕНОРУТОН 2% Гел

- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Не използвайте **ВЕНОРУТОН 2% Гел** след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
- Съхранявайте **ВЕНОРУТОН 2% Гел** в оригиналната опаковка.
- Да се съхранява при температура под 30 °C.
- Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ВЕНОРУТОН 2% Гел

Активното вещество е 2% О-(β-хидроксиетил)-рутозиди.



Другите съставки (помощни вещества) са карбомер 980, натриев хидроксид, динатриев едетат, разтвор на бензалкониев хлорид, пречистена вода.

Как изглежда ВЕНОРУТОН 2% Гел и какво съдържа опаковката

ВЕНОРУТОН 2% Гел е хомогенен, прозрачен до леко опалесцентен, оцветен в златистожълто, практически без мирис гел.

Опаковка: алуминиева туба от 40 g.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 München, Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението.

Салвис Фарма ООД,

1528 София, ул. Димитър Пешев 5,

тел./факс: +359 882532901

Дата на последно преразглеждане на листовката

