

ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Викс Актив Макс 1000 mg/ 12,2 mg прах за перорален разтвор
парацетамол/ фенилефринов хидрохлорид
Vicks Active Max 1000 mg/ 12,2 mg powder for oral solution
paracetamol/ phenylephrine hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се предлага без лекарско предписание. Трябва обаче да приемате Викс Актив Макс внимателно, за да получите най-добрите резултати.

- **Запазете тази листовка.** Може да се наложи да я прочетете отново.
- Попитайте Вашия фармацевт, ако се нуждаете от повече информация или съвет.
- Трябва да се свържете с Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят след 5 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. **Какво представлява Викс Актив Макс и за какво се използва**
2. **Преди да приемете Викс Актив Макс**
3. **Как да приемате Викс Актив Макс**
4. **Възможни нежелани реакции**
5. **Как да съхранявате Викс Актив Макс**
6. **Допълнителна информация**

1. Какво представлява Викс Актив Макс и за какво се използва

Викс Актив Макс е за облекчаване на симптоми на настинка и грип като главоболие, болки, възпалено гърло, запушване на носа и за понижаване на температурата. Той съдържа две активни съставки:

- парацетамол е добре известно болкоуспокояващо средство (аналгетик) и може също да понижи повишената температура (антипиретик);
- фенилефринов хидрохлорид (назален деконгестант) намалява отока на дихателния път в носа и така облекчава състоянието при запушване на носа.

2. Преди да приемете Викс Актив Макс

Не приемайте Викс Актив Макс:

- ако сте алергични към парацетамол, фенилефрин или някоя от останалите съставки (вижте точка 6);
- ако имате сериозно сърдечно заболяване;
- ако имате високо кръвно налягане (хипертония);
- ако имате тежко чернодробно заболяване;
- ако имате бъбречно заболяване или проблеми с бъбреците;
- ако имате изразена свръхактивност на щитовидната жлеза (хипертиреозидизъм);
- ако имате глаукома (повишено налягане в окото) от тясно-ъгълен тип;
- ако понастоящем приемате моноаминооксидазни инхибитори (MAOI) или сте ги приемали през последните две седмици;
- ако приемате други деконгестанти за настинка и грип.



Не давайте Викс Актив Макс на деца на възраст под 15 години.

Важно: съдържа парацетамол. Да не се приема едновременно с други продукти, които съдържат парацетамол.

Незабавно трябва да се търси медицинска помощ в случай на предозиране, дори и когато се чувствате добре, поради риска от забавено, сериозно чернодробно увреждане.

Попитайте Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Викс Актив Макс:

- ако имате проблем с чернодробната функция;
- ако имате изразена свръхактивност на щитовидната жлеза (хипертиреозидизъм);
- ако сте мъж и имате увеличена простатна жлеза, тъй като може да е по-трудно да уринирате;
- ако сте диабетик или имате проблем с кръвообращението (включително синдром на Рейно);
- ако страдате от недोхранване (ако сте значително под нормалното тегло);
- ако страдате от глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност (генетично нарушение);
- ако сте бременна или кърмите.

Прием на други лекарства

Информирайте Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Викс Актив Макс, ако приемате:

- лекарства, съдържащи парацетамол или други деконгестанти за настинка и грип. Ако приемате такива, не приемайте Викс Актив Макс;
- моноаминooksидазни инхибитори (МАОИ), използвани за лечение на депресия или болестта на Паркинсон. Не приемайте Викс Актив Макс, ако сте приемали МАОИ през последните 14 дни;
- трициклически антидепресанти за депресия, като амитриптилин или имипрамин;
- лекарство за високо кръвно налягане (антихипертензивен продукт), включително бета-блокери, или за подобряване на сърдечната функция или коригиране на абнормен сърдечен ритъм (дигоксин, ланоксин, дигитоксин);
- лекарство за гадене и повръщане (като метоклопрамид или домперидон);
- лекарство за разреждане на кръвта (антикоагуланти), като варфарин или други кумарини;
- лекарство за висок холестерол (като холестирамин);
- седативи (барбитурати);
- продукти, съдържащи аспирин;
- хлорамфеникол (антибиотик);
- пробеницид или AZT (зидовудин).

Прием на Викс Актив Макс с храна и напитки

Не приемайте този продукт с алкохолни напитки.

Бременност и кърмене

Прием на Викс Актив Макс по време на бременност или кърмене не се препоръчва: трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт преди употреба.

Важна информация за някои от съставките на Викс Актив Макс

Този продукт съдържа:

- аспартам (E951), източник на фенилаланин. Може да бъде вреден за хора с фенилкетонурия;



- захароза. Ако знаете от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да приемате този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Викс Актив Макс

Винаги приемайте Викс Актив Макс точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт; ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

Това лекарство е прах, който трябва да бъде разтворен във вода и приет като топла напитка. Изсипете едно саше в чаша със стандартен размер. Напълнете с топла, но не вряща вода (около 250 ml). Оставете да изстине до температура, подходяща за пиене.

Възрастни: 1 саше на всеки 4-6 часа според необходимостта.

Юноши (на възраст над 15 години): 1 саше на всеки 6 часа според необходимостта.

Да не се приемат повече от 4 сашета за всеки 24 часов период.

Да не се дава на деца под 15 години, освен по съвета на Вашия лекар.

Не надвишавайте препоръчителните дози.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако симптомите продължат повече от 5 дни или се влошат.

Ако сте приели повече от необходимата доза Викс Актив Макс

Незабавно потърсете медицинска помощ, ако по невнимание приемете повече отколкото трябва, дори ако се чувствате добре, поради риска от забавено, сериозно чернодробно увреждане.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства Викс Актив Макс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако имате някоя от следните нежелани реакции, или се случи нещо необичайно, незабавно прекратете приема на това лекарство.

Фенилефрин може рядко да причини ускорено сърцебиене (палпитации).

Рядко може да се появи високо кръвно налягане с главоболие, повръщане и палпитации.

Фенилефрин може също да причини и нарушен сън (безсъние), нервност, треперене (тремор), тревожност, безпокойство, объркване, раздразнителност или тревожност.

Тези нежелани реакции са редки (засягат по-малко от 1 на 1000 души, но повече от 1 на 10 000 души).

Загуба на апетит, гадене или повръщане са чести при фенилефрин (засягат повече от 1 на 100 души, но по-малко от 1 на 10 души).

При парацетамол има съобщения за определени нарушения на кръвта, но това е много рядко (засяга по-малко от 1 на 10 000 души). Ако се случи това, симптомите може да включват необичайно кървене или инфекции като възпалено гърло.



Алергични реакции (като кожен обрив или уртики); тежки алергични реакции (анафилаксия); хрипове или затруднено дишане може да се появят рядко (засягат по-малко от 1 на 1000 души, но повече от 1 на 10 000 души).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Викс Актив Макс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не приемайте Викс Актив Макс след срока на годност, отбелязан върху сашето или картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°C.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Викс Актив Макс

- Активните вещества са парацетамол и фенилефринов хидрохлорид. Едно саше съдържа 1000 mg парацетамол и 12,2 mg фенилефринов хидрохлорид (еквивалентен на 10 mg фенилефринова база).
- Другите съставки са захароза, натриев цитрат, лимонена киселина, аскорбинова киселина, калиев ацесулфам(E950), аспартам (E951), хинолиново жълто (E104), лимонов аромат 875928 F/29088 (лимоново масло, малтодекстрин, захароза, модифицирано царевично нишесте), лимонов сок 87A069 F/29089 (натурален цитрал, малтодекстрин, модифицирано царевично нишесте, силициев диоксид колоиден безводен), лимонов аромат 875060 F/28151(натурален цитрал, цитронелол и линолол, малтодекстрин, арабска гума, бутилиран хидроксианизол), лимонов аромат F/501.476/AP0504 (цитрон, малтодекстрин, модифицирано царевично нишесте, глицерил триацетат, α -токоферол).

Как изглежда Викс Актив Макс и какво съдържа опаковката

Викс Актив Макс е жълт прах за перорален разтвор, който е опакован в ламинирани сашета, поставени в картонена опаковка. Продуктът се предлага в картонени опаковки с 5 и 10 сашета.

За допълнителна информация относно този продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт, или се свържете с притежателя на разрешението за употреба.

Притежател на разрешението за употреба

Тева Фармасютикълс България ЕООД
ул. Н. В. Гогол 15, ет.1, 1124 София
България



Производител
Wrafton Laboratories Limited
Braunton,
Devon,
EX33 2DL
Обединено Кралство

Дата на последно преразглеждане на листовката

