

Листовка: информация за пациента

Захрон Комби 10 mg/5 mg твърди капсули
Захрон Комби 10 mg/10 mg твърди капсули
Захрон Комби 20 mg/5 mg твърди капсули
Захрон Комби 20 mg/10 mg твърди капсули

Розувастатин/Амлодипин

Zahron Combi 10 mg/5 mg capsules, hard
Zahron Combi 10 mg/10 mg capsules, hard
Zahron Combi 20 mg/5 mg capsules, hard
Zahron Combi 20 mg/10 mg capsules, hard

Rosuvastatin/Amlodipine

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Захрон Комби и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Захрон Комби
3. Как да приемате Захрон Комби
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Захрон Комби
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20180190192192193
Разрешение №	BG/MA/HP-10269-22
Одобрение №	21-04-2020

1. Какво представлява Захрон Комби и за какво се използва

Захрон Комби съдържа две активни вещества - розувастатин и амлодипин.

Захрон Комби е показан при възрастни за лечение на повишено кръвно налягане и съпътствано от високо ниво на холестерола, когато промяната на хранителния режим и засилени физически упражнения не са достатъчни, за да се коригират нивата на холестерола и/или за профилактика на сърдечно-съдовите инциденти и ако имате други фактори, които повишават риска от сърдечен удар, инсулт или свързани с тях здравословни проблеми.

Захрон Комби е показан за пациенти които вече приемат розувастатин и амлодипин в същите дози. Вместо да приемате розувастатин и амлодипин като отделни таблетки, ще получите една капсула Захрон Комби която съдържа двете активни вещества в същата концентрация.

Вие трябва да продължите диетата за понижаване на холестерола и физическите упражнения докато приемате Захрон Комби.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Захрон Комби



Не приемайте Захрон Комби:

- Ако сте алергични към розувастатин, амлодипин, към някои други калциеви антагонисти, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- Ако сте бременна или кърмите. Ако забременеете, докато приемате Захрон Комби, спрете приемът незабавно и се обадете на Вашия лекар. Жените трябва да избягват забременяването, докато взимат Захрон Комби, чрез подходяща контрацепция.
- Ако имате заболяване на черния дроб.
- Ако имате тежки проблеми с бъбреците.
- Ако сте имали повтарящи се и необясними болки в мускулите.
- Ако взимате лекарство, наречено циклоспорин (използвано напр. след органна трансплантация).
- Имате силно понижено артериално налягане (тежка хипотония).
- Ако имате стеснение на аортната клапа на сърцето (аортна стеноза) или кардиогенен шок (състояние, при което сърцето ви не е в състояние да доставя достатъчно кръв към тялото).
- Страдате от сърдечна недостатъчност след прекаран остър миокарден инфаркт.


Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Захрон Комби.

- Ако имате проблеми с бъбреците.
- Ако имате проблеми с черния дроб.
- Ако сте имали повтарящи се и необясними болки в мускулите, лична или фамилна анамнеза за проблеми с мускулите или предхождаща анамнеза за мускулни проблеми при прием на други понижаващи холестерола лекарства. Незабавно се свържете с лекаря си, ако имате необясними болки в мускулите и особено, ако се почувствате зле или имате температура. Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако почувствате мускулна слабост, която е постоянна.
- Ако редовно пиете голямо количество алкохол.
- Ако щитовидната Ви жлеза не функционира нормално.
- Ако приемате други лекарства, наречени фибрати, за понижаване на холестерола. Моля, прочетете тази листовка внимателно, дори и вече да сте приемали други лекарства срещу висок холестерол.
- Ако приемате лекарства, използвани за борба с ХИВ инфекция, напр. ритонавир с лопинавир и/или атазанавир, моля, вижте „Други лекарства и Захрон Комби“.
- Ако приемате или сте приемали през последните 7 дни лекарство, наречено фузидова киселина, (лекарство за лечение на бактериални инфекции) перорално или чрез инжектиране. Приемът на Захрон Комби и от фузидова киселина може да доведе до сериозни проблеми с мускулите (рабдомиолиза), моля, вижте „Други лекарства и Захрон Комби“.
- Ако имате тежка дихателна недостатъчност.
- Ако наскоро сте имали сърдечен пристъп.
- Ако страдате от сърдечна недостатъчност.
- Ако имате тежка форма на повишено кръвното налягане (хипертонична криза)
- Ако сте в старческа възраст.
- Ако сте от азиатски произход - това е японски, китайски, филипински, вьетнамски, корейски и индийски. Вашият лекар трябва да избере правилната доза за начало на лечението с Захрон Комби, която да е подходяща за Вас.

При малък брой хора, статините могат да засегнат черния дроб. Това се установява с просто изследване, чиято цел е да установи дали са увеличени нивата на чернодробните ензими в кръвта. Поради тази причина Вашият лекар ще Ви направи кръвно изследване (изследване на чернодробната функция) преди и по време на лечението с Захрон Комби..

Докато приемате това лекарство, Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно, ако страдате от диабет или сте изложени на риск да развие диабет. По-вероятно е Вие да бъдете изложени на риск от развитие на диабет, ако имате високи нива на захар и мазнини в кръвта, наднормено тегло и имате високо кръвно налягане.



Деца и юноши

Захрон Комби не трябва да се използва от деца и юноши.

Други лекарства и Захрон Комби

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Захрон Комби може да повлияе или на него да му повлияят други лекарства, като:

- варфарин или клопидогрел (или друго лекарство за разреждане на кръвта),
- фибрати (като гемфиброзил, фенофибрат) или което и да е друго лекарство за понижаване на холестерола (като езетимиб),
- лекарства при лошо храносмилане (използвани за неутрализиране на киселина в стомаха Ви),
- перорални контрацептиви (противозачатъчни таблетки),
- хормонозаместителна терапия,
- ритонавир с лопинавир и/или атазанавир, индинавир, нелфинавир (използвани за борба с ХИВ инфекция - вижте „Предупреждения и предпазни мерки“),
- кетоконазол, итраконазол (противогъбични лекарства)
- рифампицин, еритромицин, кларитромицин (антибиотици)
- Хиперикум перфоратум (жълт кантарион)
- верапамил, дилтиазем (лекарства за сърце)
- дантролен (инфузия при тежки нарушения на телесната температура)
- Темзиролимул или други лекарства при лечение на рак (химиотерапия)
- Еверолимул, такролимул, циклоспорин или други лекарства (използвани, за да контролират отговора на имунната система на Вашето тяло и по този начин подпомага Вашето тяло да приеме трансплантирания орган)
- симвастатин (използван за понижаване нивото на холестерола)
- регорафениб (използван за лечение на рак)
- всяко от следните лекарства, използвани за лечение на вирусни инфекции, включително ХИВ или инфекция с хепатит С, самостоятелно или в комбинация (моля, вижте „Предупреждения и предпазни мерки“): ритонавир, лопинавир, атазанавир, симепревир, омбитасвир, паритапревир, дазабувир, велпатасвир, гразопревир, елбасвир, глекапревир, пибрентасвир.

Ако трябва да приемате перорално фузидова киселина за лечение на бактериална инфекция, ще трябва временно да спрете да използвате Захрон Комби. Вашият лекар ще Ви каже кога е безопасно да започнете за вземате това лекарство отново. Приемът на Захрон Комби с фузидова киселина рядко може да доведе до мускулна слабост, чувствителност или болка (рабдомиолиза). Вижте повече информация за рабдомиолиза в точка 4.

Захрон Комби може да понижи кръвното Ви налягане, още повече, ако вече приемате други лекарства за лечение на Вашето високо кръвно налягане.

Захрон Комби с храна и напитки

Вие можете да приемате Захрон Комби с или без храна.

Сок от грейпфрут и грейпфрут не трябва да се консумират от хора, които приемат Захрон Комби. Това се дължи на факта, че грейпфрут и сока от грейпфрут могат да доведат до повишаване на кръвните нива на активното вещество амлодипин, което може да доведе до непредсказуемо засилване на понижавания ефект на Захрон Комби върху кръвното налягане.

Бременност и кърмене

Не приемайте Захрон Комби, ако сте бременна или кърмите. Ако забременеете докато приемате Захрон Комби, спрете веднага приема и се консултирайте с Вашия лекар. Жените трябва да избягват забременяване докато приемат Захрон Комби чрез използване на подходяща контрацепция.

Шофиране и работа с машини



Захрон Комби може да повлияе на способността Ви за шофиране или работа с машини. Някои хора се чувстват замаяни по време на лечението със Захрон Комби. Ако капсулите ви карат да се чувствате зле, чувствате се замаяни или уморени или ви причиняват главоболие, не трябва да шофирате или да използвате машини и незабавно се свържете с Вашия лекар.

3. Как да приемате Захрон Комби

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една капсула на ден.

Вашето лекарство може да се използва преди или след храна и напитки. Трябва да приемате Вашето лекарство по едно и също време всеки ден с чаша вода. Не приемайте Захрон Комби със сок от грейпфрут.

Употреба при деца и юноши

Захрон Комби не трябва да се използва от деца и юноши.

Редовни проверки на холестерола

Важно е да се върнете при Вашия лекар за редовни проверки на холестерола, за да сте сигурни, че нормалното ниво на холестерола е достигнато и се поддържа постоянно.

Вашият лекар може да реши да увеличи дозата Ви, така че да приемате дозата Захрон Комби, която е най-добра за Вас.

Ако сте приели повече от необходимата доза Захрон Комби

Свържете се с Вашия лекар или най-близката болница. Приемът на твърде много капсули може да причини понижаване на Вашето кръвно налягане и то да стане ниско или дори опасно ниско. Може да почувствате замаяване, световъртеж, умора или слабост. Ако кръвното ви налягане се понижи прекалено много може да изпаднете в шок. Вашата кожа може да стане хладна и лепкава и може да изгубите съзнание.

Ако постъпите в болница или Ви лекуват за друго заболяване, кажете на медицинския персонал, че приемате Захрон Комби.

Ако сте пропуснали да приемете Захрон Комби

Не се притеснявайте. Ако сте пропуснали да вземете капсула, пропуснете тази доза. Вземете следващата доза в точното време. Не вземайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата капсула.

Ако сте спрели приема на Захрон Комби

Вашият лекар ще Ви посъветва колко дълго да приемате Вашето лекарство. Стойностите на Вашия холестерол може да се увеличат отново, ако спрете да приемате Захрон Комби. Вашето заболяване може да се възобнови, ако сте спрели употребата на Вашето лекарство преди да бъдете посъветвани за това.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Посетете Вашия лекар **незабавно**, ако имате някоя от следните много редки, тежки нежелани реакции след приема на това лекарство:



- Внезапни хрипове, гръдна болка, недостиг на въздух или затруднено дишане.
- Подуване на клепачите, лицето или устните
- Подуване на езика и гърлото, което причинява големи затруднения в дишането и/или преглъщането.
- Тежки кожни реакции, включително интензивен кожен обрив, уртикария, зачервяване на кожата по цялото тяло, силен сърбеж, мехури по кожата, белене и подуване на кожата, възпаление на лигавиците (синдром на Stevens-Johnson) или други алергични реакции
- Сърдечен удар, абнормен сърдечен ритъм.
- Възпаление на панкреаса, което може да причини силна коремна болка и болки в гърба, - придружени с усещането, че сте много зле.
- Синдром на лупус-подобно заболяване (включително обрив, ставни нарушения и ефекти върху кръвните клетки).
- Разкъсване на мускулите.

Също така спрете приема на Захрон Комби и се свържете с лекаря си незабавно, ако имате необичайни болки в мускулите, за които не знаете причината или продължат по-дълго, отколкото очаквате. Както при другите статини, много малък брой хора могат да изпитат неприятни ефекти върху мускулите си, които рядко водят до живото-застрашаващо увреждане на мускулите, известно като рабдомиолиза.

Следните честни нежелани реакции са били докладвани. Ако някоя от тях Ви причини проблеми, или ако те продължат повече от една седмица, трябва да се свържете с Вашия лекар.

РОЗУВАСТАТИН

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 души

- Главоболие
- Болки в стомаха
- Запек
- Повдигане
- Мускулна болка
- Чувство за слабост
- Замайване
- Незначително повишаване на количеството белтък в урината - обикновено тези стойности се нормализират, без да се налага да спрете приема на Захрон Комби капсули.
- Диабет. По-вероятно е това да се случи, ако имате високи стойности на захар и мазнини в кръвта, ако сте с наднормено тегло и имате високо кръвно налягане. Вашият лекар ще Ви наблюдава, докато приемате това лекарство.

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души

- Обрив, сърбеж или други кожни реакции
- Повишаване на количеството белтък в урината - обикновено тези стойности се нормализират, без да се налага да спрете приема на Захрон Комби капсули (само дози 5 - 20 mg).

Редки: могат да засегнат до 1 на 1000 души

- Тежка алергична реакция - признаците са подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото, затруднено преглъщане и дишане, силен сърбеж по кожата (с обрив). **Ако смятате, че имате алергична реакция, спрете приема на Захрон Комби и потърсете незабавно медицинска помощ.**
- Мускулно увреждане при възрастните - като предпазна мярка, **спрете приема на Захрон Комби и се консултирайте с Вашия лекар незабавно, ако имате никакви необичайни болки или болки в мускулите, които продължават по-дълго от очакваното.**
- Силна болка в стомаха (възпаление на панкреаса)
- Повишаване на чернодробните ензими в кръвта
- Редуциране на тромбоцитите в кръвта, което може да повиши риска от кървене или синини (тромбоцитопения).



Много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 човека

- Жълтеница (пожълтяване на кожата и очите)
- Хепатит (възпаление на черния дроб)
- Следи от кръв в урината
- Увреждане на нервите на ръцете и краката (изтръпване)
- Болки в ставите
- Загуба на паметта
- Гинекомастия (уголемяване на гърдите при мъжете)

С неизвестна честота: не могат да се предвидят от наличните данни

- Диария (редки изпражнения)
- Синдром на Stevens-Johnson (силно изприщване на кожата, устата, очите и половите органи)
- Кашлица
- Недостиг на въздух
- Оток (подуване)
- Нарушения на съня, включително безсъние и кошмари
- Дихателни проблеми включително упорита кашлица и/или недостиг на въздух или треска
- Нараняване на сухожилията
- Нервно разстройство, което може да причини слабост, изтръпване или скованост

АМЛОДИПИН

Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 души

- Оток (подуване)

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души

- Главоболие, световъртеж, сънливост (особено в началото на лечението)
- Сърцебиене (усещате биенето на сърцето), зачервяване на лицето
- Коремна болка, неразположение (гадене)
- Подуване на глезена (оток), умора
- Диария или запек
- Нарушено храносмилане
- Мускулни крампи
- Слабост
- Нарушения на зрението, двойно виждане

Другите нежелани реакции, които са били съобщавани са включени в списъка по-долу. Ако някоя от тях стане сериозна, или ако забележите някакви нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души

- Промени в настроението, тревожност, депресия, безсъние
- Треперене, вкусови аномалии, припадъци, слабост
- Изтръпване или усещане за изтръпване на крайниците, загуба на чувство за болка
- Шум в ушите
- Ниско кръвно налягане
- Кихане/ хрема, причинена от възпаление на лигавицата на носа (ринит)
- Сухота в устата, повръщане (прилошаване)
- Косопад, повишено изпотяване, сърбеж по кожата, червени петна по кожата, обезцветяване на кожата
- Разстройство при уриниране, повишена нужда за уриниране през нощта, по-често уриниране
- Невъзможност да се получи ерекция, дискомфорт или уголемяване на гърдите при мъжете
- Анормален сърдечен ритъм
- Недостиг на въздух
- Кашлица
- Обрив, сърбеж, уртикария
- Болка, болка в гърдите, чувство на неразположение



- Ставни или мускулни болки, болка в гърба
- Повишаване на телното или отслабване

Редки: може да засегнат до 1 на 1 000 души

- Обърканост

Много редки: може да засегнат до 1 на 10 000 потребители

- Намалване на броя на белите кръвни клетки, намалване на тромбоцитите в кръвта, което може да доведе до необичайни синини по кожата или лесно кървене (увреждане на червените кръвни клетки)
- Повишаване на захарта в кръвта (хипергликемия)
- Заболяване на нервите, което може да доведе до слабост, изтръпване или скованост
- Подуване на венците
- Подуване на корема (гастрит)
- Нарушена функция на черния дроб, възпаление на черния дроб (хепатит), пожълтяване на кожата (жълтеница), повишаване на чернодробните ензими, което може да има ефект върху някои медицински тестове
- Повишаване на напрежението в мускулите
- Възпаление на кръвоносните съдове, често с кожен обрив
- Чувствителност към светлина
- Заболяване комбиниращо ригидност, тремор, и/или двигателни нарушения
- Сърдечен удар
- Алергична реакция
- Тежка стомашна болка (възпаление на панкреаса)
- Тежки кожни реакции, включително силен кожен обрив, уртикария, зачервяване на кожата на цялото Ви тяло, силен сърбеж, образуване на мехури, лющене и подуване на кожата, възпаление на лигавиците (синдром на Stevens Johnson) или други алергични реакции

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Захрон Комби

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след „EXP/Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 30°C. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Захрон Комби

Активните вещества са розувастатин (като розувастатин калций) и амлодипин (като амлодипинов безилат).

10 mg/5 mg: Всяка твърда капсула съдържа 10 mg розувастатин (като розувастатин калций) и 5 mg амлодипин (като амлодипинов безилат).

10 mg/10 mg: Всяка твърда капсула съдържа 10 mg розувастатин (като розувастатин калций) и 10 mg амлодипин (като амлодипинов безилат).

20 mg/5 mg: Всяка твърда капсула съдържа 20 mg розувастатин (като розувастатин калций) и 5 mg амлодипин (като амлодипинов безилат).

20 mg/10 mg: Всяка твърда капсула съдържа 20 mg розувастатин (като розувастатин калций) и 10 mg амлодипин (като амлодипинов безилат).

Другите съставки са:

Съдържание на капсулата: царевично нишесте, прежелатинизирано нишесте, микрокристална целулоза, кросповидон тип А, натриев стеарилфумарат

Обвивка на капсулата: желатин, титанов диоксид (E 171)

Червено мастило: шеллак (E904), пропиленгликол (E1520), силен амонячен разтвор (E527), червен железен оксид (E172), калиев хидроксид (E525)

Зелено мастило: шеллак (E904), титанов диоксид (E171), индиготин (E132), жълт железен оксид (E172), силен амонячен разтвор (E527), пропилен гликол (E1520)

Как изглежда Захрон Комби и какво съдържа опаковката

10 mg/5 mg: твърди желатинови капсули с размер 1 и бяло непрозрачно тяло с червено обозначение "Aml 5 mg" и бяла непрозрачна капачка със зелено обозначение "Rsv 10 mg".

10 mg/10 mg: твърди желатинови капсули с размери 00 и бяло непрозрачно тяло с червено обозначение "Aml 10 mg and line" и бяла непрозрачна капачка със зелено обозначение "Rsv 10 mg"

20 mg/5 mg: твърди желатинови капсули с размер 00 и бяло непрозрачно тяло с червено обозначение "Aml 5 mg" и бяла непрозрачна капачка със зелено обозначение "Rsv 20 mg and line"

20 mg/10 mg: твърди желатинови капсули с размери 00 и бяло непрозрачно тяло с червено обозначение "Aml 10 mg and line" и бяла непрозрачна капачка със зелено обозначение "Rsv 20 mg and line".

Захрон Комби е достъпен в блистери, съдържащи 10, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 и 100 твърди капсули.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Zentiva k.s.
U kabelovny 130,
Dolní Měcholupy
102 37, Prague 10
Чешка Република

Производител



Adamed Pharma S.A.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
95-200 Pabianice
Полша

Adamed Pharma S.A.
ul. Szkolna 33
95-054 Ksawerów
Полша

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

България	Захрон Комби 10 mg/5 mg твърди капсули Захрон Комби 10 mg/10 mg твърди капсули Захрон Комби 20 mg/5 mg твърди капсули Захрон Комби 20 mg/10 mg твърди капсули
Гърция	Zahron Combi
Германия	Rosuvastatin/Amlodipin-ratiopharm 10 mg/5 mg Hartkapseln Rosuvastatin/Amlodipin-ratiopharm 10 mg/10 mg Hartkapseln Rosuvastatin/Amlodipin-ratiopharm 20 mg/5 mg Hartkapseln Rosuvastatin/Amlodipin-ratiopharm 20 mg/10 mg Hartkapseln
Италия	Rozamlad
Полша	Zahron Combi
Португалия	ASUTAM 10 mg + 5 mg, capsule, hard ASUTAM 10 mg + 10 mg, capsule, hard ASUTAM 20 mg + 5 mg, capsule, hard ASUTAM 20 mg + 10 mg, capsule, hard
Хърватия	Rosix-Am
Чешка република	Zahron Combi
Словакия	ZAHRON COMBI 10 mg/5 mg ZAHRON COMBI 10 mg/10 mg ZAHRON COMBI 20 mg/5 mg ZAHRON COMBI 20 mg/10 mg

Дата на последно преразглеждане на листовката: 01/2020

