

Листовка: информация за пациент

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рев. №	20000096
Разрешение №	30 -05- 2023
БГ/МА/МР - 62580	/
Одобрение №	/

Зил Т маз
Zeel T ointment

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Зил Т
3. Как да използвате Зил Т
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Зил Т
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Използва се при артроза (особено гонартроза), полиартроза, спондилартроза, хумероскалпуларен периартрит.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Зил Т

Не използвайте Зил Т

- ако сте алергични към активното(ите) вещество(а) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Зил Т.

Ако симптомите продължат или се влошат да се преоценят лечението.

Други лекарства и Зил Т

Не са известни лекарствени взаимодействия.



Зил Т с храна, напитки и алкохол
Няма несъвместимости.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Зил Т не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

Зил Т съдържа цетилстеарил алкохол и етанол

Този лекарствен продукт съдържа 1030 mg алкохол (етанол) в 10 g (10.3% w/w).
Може да причини усещане за изгаряне върхуувредена кожа.

Цетилстеарилалкохол може да предизвика локални кожни реакции (контактен дерматит).
Да се избягва контакт с очи, лигавици, открити рани илиувредена кожа.

3. Как да приемете Зил Т

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Ако няма друго предписание, възрастни и деца над 6 год, се нанася върху засегнатите места сутрин и вечер, например в областта на колянната става се втрива от мазта лента с дължина 4-5 см.

Начин на приложение:

Външно.

Употреба при деца

За деца над 6 годишна възраст.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Зил Т

Зил Т няма доза на предозиране.

Ако сте пропуснали да използвате Зил Т

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Зил Т

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар.



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. В много редки случаи може да предизвика реакция на свръхчувствителност и/или алергична кожна реакция.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Зил Т

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност – 3 години.

Срок на годност след отваряне на тубата – 12 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Зил Т

100 g съдържат:

- Активни вещества:

Cartilago suis	D2	0,001 g
Funiculus umbilicalis suis	D2	0,001 g
Embryo suis	D2	0,001 g
Placenta suis	D2	0,001 g
Rhus toxicodendron	D2	0,27 g
Arnica montana	D2	0,3 g
Solanum dulcamara	D2	0,075 g
Symphytum	D8	0,75 g
Sanguinaria canadensis	D2	0,225 g
Sulfur	D6	0,27 g
Nadidum	D6	0,01 g
Coenzym A	D6	0,01 g



Acidum alpha-liponicum	D6	0,01 g
Natrium diethyloxalaceticum	D6	0,01 g
Acidum silicicum	D6	1 g

- Други съставки (помощни вещества): Етанол 96%, Пречистена вода, емулгиращ цетостеарилов алкохол (тип А), течен парафин, бял мек парафин.
Съдържа 12,8 об.% алкохол.

Как изглежда Зил Т и какво съдържа опаковката

Алуминиева туба с вътрешно и външно лаково покритие, херметически затворена с мембрана и зелена капачка от PP, съдържаща 50 g маз / картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Германия

Phone: 0049 (0)7221 501 00, Fax: 0049 (0)7221 501 485

Дата на последно преразглеждане на листовката 02/2023.

