

Листовка: Информация за потребителя

Zeel T, oral solution

Зил Т, перорален разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт

ИЗПОЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	26060347
Разрешение №	11-21361 / 07.03.2013
Одобрение №	/

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва
2. Преди да приемете Зил Т
3. Как да приемете Зил Т
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Зил Т
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Артроза (особено гонартроза (хронични промени на колянната става)), полиартроза (хронични промени на няколко стави), спондилартроза (хронични промени на ставите на гръбначния стълб), хумероскапуларен периартрит (възпаление на раменната става).

2. Преди да приемете Зил Т

- Да не се предписва на пациенти, свръхчувствителни към съставките на продукта. Да се използва след консултация с лекар при настоящи или минали чернодробни заболявания и/или при приемането на хепатотоксичен препарат.
- Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
- Употреба на Зил Т с храни и напитки – няма несъвместимости
- Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Тъй като продукта съдържа сангвинария, да не се използва по време на бременност и кърмене.
- Шофиране и работа с машини – Зил Т не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

3. Как да приемете Зил Т

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обикновено 1 ампула се разтваря във вода и се изпива преди хранене 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 1-3 ампули дневно. Да не се инжектира!



- Употреба при деца – Да не се прилага при деца!
- Ако сте приели повече от обичайната доза – Зил Т няма доза на предозиране
- Ако сте пропуснали да приемете Зил Т – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
- Ако сте спрели употребата на Зил Т – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако симптомите продължат или състоянието се влоши се консултирайте с лекар или фармацевт

4. Възможни нежелани реакции

По време на приемането на препарати, съдържащи сангвинария в единични случаи се наблюдава повишаване на нивата на чернодробните ензими (трансаминази) и билирубин, които са признак за лекарствено пречинен хепатит или жълтеница. Тези симптоми изчезват след приключване на лечението. В много редки случаи могат да се появят гастроентестинални симптоми или кожни реакции до няколко дни след използването на препарата. При пациенти с доказана алергия към растения от сем. Срадикови могат да се получат реакции на свръхчувствителност (дори с анафилактичен шок). В много редки случаи гастроинтестинални симптоми или кожни реакции могат да се появят до няколко дни след приложението на препарата.

5. Как да съхранявате Зил Т

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

Срок на годност – 5 години.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

- Какво съдържа Зил Т

1 ампула от 2,0 ml (=2,0 g) съдържа:

Активни вещества:

Cartilago suis	D6 2 mg
Funiculus umbilicalis suis	D6 2 mg
Embryo suis	D6 2 mg
Placenta suis	D6 2 mg
Solanum dulcamara	D3 10 mg
Symphytum officinale	D6 10 mg
Nadidum	D8 2 mg
Coenzym A	D8 2 mg
Sanguinaria canadensis	D4 3 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D8 2 mg
Acidum alpha-liponicum	D8 2 mg
Toxicodendron quercifolium	D2 10 mg
Arnica montana	D4 200 mg
Sulfur	D6 3 mg



Помощни вещества

Вода за инжекции

Натриев хлорид

- Как изглежда и какво съдържа опаковката: Ампули от безцветно стъкло тип I (2,0 ml) с маркировка цветна точка, 2 вложки по 5 амп., поставени в картонена кутия

- Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

- Дата на последно одобрение на листовката: 07.2012

