

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

КОКУЛИН, таблетки
COCCULINE, tablets

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка една таблетка съдържа:

Cocculus indicus	4 CH.....	0,375 mg
Nux vomica	4 CH.....	0,375 mg
Tabacum	4 CH.....	0,375 mg
Petroleum	4 CH.....	0,375 mg

Помощни вещества с известно действие: лактоза, захароза.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка.

Бели кръгли двойноизпъкнали таблетки.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

- Профилактика и лечение на прилошаване при пътуване: морска болест, въздушна болест, прилошаване в кола.
- Лечение на гадене и повръщане без повищена температура.

4.2 Дозировка и начин на приложение

За перорално приложение.

Таблетките се държат в устата до пълното им разтваряне.

При прилошаване при пътуване:

- Профилактично: по 2 таблетки 3 пъти дневно в деня преди пътуването и в деня на пътуването.
- С лечебна цел: по 2 таблетки на всеки час при появяване на симптомите. Приемът се повтаря при нужда.

При гадене и повръщане без повищена температура:

За деца под 24 месеца е необходима консултация с лекар, преди да приемат лекарството.

- При първите симптоми: по 1 таблетка при всяко гадене и/или повръщане. Приемите се разреждат при подобрене. Приемът се спира когато симптомите изчезнат.

Да не се приемат повече от 6 таблетки на ден. Лечението не трябва да надвишава 48 часа без лекарска консултация.

Ако симптомите продължават или се влошават трябва да потърсите лекарска помощ.

Деца под 6 години: таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества изброени в точка 6.1.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1	
Към Рев. № 9600051	
Разрешение № B6/МА7/1/б-54013	
Ободрение № , 31.03.2021	



4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациентите с редки наследствени състояния на галактозна непоносимост, Lapp лактазна недостатъчност или глукозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

Пациентите с редки наследствени състояния на непоносимост към фруктоза, глукозо-галактозна малабсорбция или захаразно-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат това лекарство.

Ако след употреба на продукта симптомите продължават или състоянието се влоши, да се преоценят лечението.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Този лекарствен продукт трябва да се приема за предпочитане извън храненето.
Въпреки това, не се очаква никакво взаимодействие с храни и напитки.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Този лекарствен продукт може да се използва по време на бременност и кърмене и не оказва влияние върху фертилитета.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Няма съобщения за нежелани лекарствени реакции.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/рисък за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
тел.: +35928903417
уебсайт: www.bda.bg

4.9 Предозиране

Неприложимо.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: хомеопатичен лекарствен продукт.

Терапевтичните показания на този лекарствен продукт се основават на традиционната хомеопатична употреба на неговите съставки.



КОКУЛИН съдържа четири активни вещества, използвани при следните симптоми:

- *Coccus indicus*: прилошаване при пътуване, гадене и повръщане при бременност, гадене и висене на свят при мигрена.
- *Nux vomica*: прилошаване при пътуване, гадене облекчаващо се след повръщане; при злоупотреба с храна и алкохол; гадене и повръщане при бременност.
- *Tabacum*: прилошаване при пътуване, гадене, гадене и повръщане при бременност.
- *Petroleum*: прилошаване при пътуване, сутрешно гадене, гадене със световъртеж при мигрена, гадене при бременност.

5.2 Фармакокинетични свойства

Неприложимо.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Неприложимо.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Лактоза

Захароза

Магнезиев стеарат

6.2 Несъвместимости

Неприложимо.

6.3 Срок на годност

5 години.

6.4 Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

Блистери от PVC/Al-фолио с по 30 таблетки.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Няма специални изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Франция



8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Регистрационен № 9600051

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешение за употреба: 08.04.1996 г.

Дата на последно подновяване: 06.04.2012 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

02.2021 г.

