

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Мовалис 7,5 mg таблетки
Movalis 7.5 mg tablets

36000232
33109 01.09.2017

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 7,5 mg мелоксикам (meloxicam)

Помощни вещества: лактоза 23,5 mg

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка

Светложълти, кръгли чупещи се таблетки, от едната страна изпъкнала със скосени ръбове и отпечатано лого на компанията, а от другата страна с делителна черта от двете страни на която е означено 59D/59D. Делителната черта е само за да спомогне разчупването, с цел по –лесно погълдане и не разделя на равни дози.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

- Краткосрочно симптоматично лечение на обостряния на остеоартроза.
- Дългосрочно симптоматично лечение на ревматоиден артрит или анкилозиращ спондилит.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Перорално приложение.

Общата дневна доза трябва да се приема еднократно, с вода или друга течност, по време на хранене. Нежеланите реакции могат да бъдат намалени като за контролиране на симптомите се употребява възможно най-ниската ефективна доза, за възможно най-кратък срок от време (вж. точка 4.4). Нуждите на пациентите от симптоматично лечение и терапевтичния отговор трябва да се оценяват периодично, особено при пациенти с остеоартрит.

- Обостряния на остеоартроза: 7,5 mg дневно (една таблетка 7,5 mg)
Ако е необходимо, при липса на подобрене дозата може да бъде повишена до 15 mg дневно (две таблетки 7,5mg)
- Ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит: 15 mg дневно (две таблетки 7,5 mg)
(вж. също точка „Специални популации“ по-долу)

В зависимост от терапевтичния отговор, дозата може да бъде намалена до 7,5 mg дневно (една таблетка 7,5 mg)

ДА НЕ СЕ ПРЕВИШАВА ДОЗАТА ОТ 15 MG ДНЕВНО



Специални популации

Пациенти в старческа възраст и пациенти с повишен рисък от нежелани реакции (вж. точка 5.2.):

Препоръчваната доза за дългосрочно лечение на ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит при пациенти в старческа възраст е 7,5 mg дневно. Пациенти с повишен рисък от нежелани реакции трябва да започват лечение със 7,5 mg дневно (вж. точка 4.4).

Бъбречно увреждане (вж. точка 5.2.)

При диализирани пациенти с тежка бъбречна недостатъчност, дозата не трябва да превишава 7,5 mg дневно. При пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане не се налага намаляване на дозата (т.е. пациенти с креатининов клирънс над 25 ml/min). (За пациенти с тежко бъбречно увреждане, без диализа вижте точка 4.3)

Чернодробно увреждане (вж. точка 5.2.)

Не се налага намаляване на дозата при пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане. (За пациенти с тежко чернодробно увреждане, вижте точка 4.3)

Деца и юноши

Movalis 7,5 mg е противопоказан при деца и юноши под 16 години (вж. точка 4.3).

Този лекарствен продукт съществува и в други концентрации, които може да са по-подходящи.

4.3 Противопоказания

Този лекарствен продукт е противопоказан в следните ситуации:

- Трети триместър на бременността (вж. точка 4.6 „Бременност и кърмене”);
- Деца и юноши под 16 години;
- Свръхчувствителност към мелоксикам или някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1, или свръхчувствителност към вещества с подобно действие, напр. нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), ацетилсалицилова киселина. Movalis не трябва да бъде приложен при пациенти с изявени симптоми на астма, назални полипи, ангиоедем или уртикария, след прием на ацетилсалицилова киселина или други НСПВС;
- Анамнеза за гастро-интестинално кървене или перфорация, свързани с предишно лечение с НСПВС;
- Активна или анамнеза за повтаряща се пептична язва/хеморагия (два или повече отделни епизода с доказана язва или кървене);
- Силно нарушенна чернодробна функция;
- Тежка бъбречна недостатъчност без диализа;
- Гастро-интестинално кървене, анамнеза за мозъчно-съдово кървене или други нарушения, свързани с кървене;
- Тежка сърдечна недостатъчност.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употребя

Нежеланите реакции могат да бъдат намалени, като за контролиране на симптомите се употребява възможно най-ниската ефективна доза, за възможно най-кратък срок от време (вж. точка 4.4 и гастро-интестинални и сърдечно-съдови рискове по-долу).

Препоръчваната максимална дневна доза не трябва да се превишава в случай на недостиг на терапевтичен ефект и не трябва да се добавя допълнително НСПВС към лечението, тъй като това може да повиши токсичността, докато терапевтично преимущество не е доказано. Едновременната употреба на мелоксикам с НСПВС, включително циклооксигеназа-2 селективни инхибитори, трябва да се избягва.



Мелоксикам не е подходящ за лечението на пациенти, нуждаещи се от облекчение на остра болка.

Клиничната полза от лечението трябва да се преосмисли при липсата на подобрение след няколко дни.

При анамнеза за езофагит, гастрит и/или гастро-интестинална язва трябва да се осигури тяхното напълно излекуване преди започване на лечение с мелоксикам. Периодично трябва да се следи за възможно възстановяване при пациенти, лекувани с мелоксикам, имащи подобна анамнеза.

Гастро-интестинални ефекти

Както и при другите НСПВС, гастро-интестинално (ГИ) кървене, язва или перфорация, които може да са фатални, могат да се проявят във всеки момент от лечението, с или без предупредителни симптоми, или предшестващо сериозно гастро-интестинално нарушение.

Ръскът от гастро-интестинално кървене, язва или перфорация се повишава с увеличаване на дозата на НСПВС, при пациенти с анамнеза за язва, особено ако е усложнена от хеморагия или перфорация (вж. точка 4.3), както и при по-възрастни пациенти. Тези пациенти трява да започнат лечение с най-ниската възможна доза. Едновременно лечение с предпазни средства (напр. мизопростол или инхибитори на протонната помпа) трябва да се обмисли при подобни пациенти, както и при пациенти, нуждаещи се от едновременно лечение с ниски дози ацетилсалицилова киселина, или други лекарства, с вероятност да повишат гастроинтестиналния рисък (вж. и точка 4.5 по-долу).

Пациенти с анамнеза за гастро-интестинална токсичност, особено пациенти в стрическа възраст, трябва да съобщават за всякакви необичайни абдоминални симптоми (по-специално ГИ кървене), особено в началната фаза на лечението.

Повищено внимание се препоръчва при пациенти, едновременно приемащи лекарства, които могат да увеличат риска от язва или кървене, като хепарин за терапевтично лечение или прилаган в гериатрията, антикоагуланти като варфарин, или други нестероидни противовъзпалителни средства, включително и ацетилсалицилова киселина, приемана в дози против възпаление ($\geq 1\text{g}$ като еднократен прием или $\geq 3\text{g}$, като обща дневна доза) (вж. точка 4.5).

При появя на гастроинтестинално кървене или язва при пациенти, приемащи меклоксикам лечението трябва да бъде спряно.

НСПВС трябва да се дават внимателно на пациенти с анамнеза за ГИ заболявания (улцерозен колит, болест на Крон), тъй като възпалението при тези състояния може да се активира (вж. точка 4.8 – нежелани реакции).

Сърдечно-съдови и мозъчно-съдови ефекти:

Необходимо е да се осигурят подходящо наблюдение и съвет за пациенти с анамнеза за хипертония и/или лека до умерена застойна сърдечна недостатъчност, тъй като има съобщения за отоци и задържане на течности, свързани с лечението с НСПВС.

Препоръчва се клинично наблюдение на кръвното налягане при пациенти в рисък, преди лечението и особено при започване на лечение с мелоксикам.

Клинични проучвания и епидемиологични данни показват, че употребата на някои НСПВС (особено във високи дози и при продължително приложение) може да бъде свързана с леко повишен рисък от артериални тромботични събития (например миокарден инфаркт или инсулт). Няма достатъчно данни, за да се изключи такъв рисък при мелоксикам.



Пациенти с неконтролирана хипертония, застойна сърдечна недостатъчност, установена исхемична болест на сърцето, заболяване на периферните артерии и/или мозъчно-съдова болест трябва да се лекуват с мелоксикам само след внимателно обмисляне. Такова обмисляне трябва да се прави преди започване на дългосрочно лечение на пациенти с рискови фактори за сърдечно-съдови събития (напр. хипертония, хиперлипидемия, захарен диабет, тютюнопушене).

Кожни реакции

Съобщава се за животозастрашаващи кожни реакции като синдром на Stevens-Johnson (SJS) и токсична епидермална некролиза (TEN) при употреба на мелоксикам. Необходимо е пациентите да бъдат предупредени за признаките и симптомите и внимателно наблюдавани за появата на такива кожни реакции. Рискът от поява на синдром на Stevens-Johnson или токсична епидермална некролиза е най-висок през първите седмици от лечението. Ако са налице симптоми или признания на токсична епидермална некролиза или синдром на Stevens-Johnson (напр. прогресиращ кожен обрив, често с мехури или мукозни лезии), лечението с мелоксикам трябва да се преустанови. Най-добри резултати в овладяването на синдром на Stevens-Johnson и токсична епидермална некролиза са налице при ранното диагностициране и незабавно прекратяване на всяко подозирano лекарство. Ранното спиране на лечението е свързано с по-добра прогноза. Ако пациентът развие синдром на Stevens-Johnson или токсична епидермална некролиза по време на приема на мелоксикам, този лекарствен продукт не трябва да се прилага отново на този пациент.

Параметри на чернодробна и бъбречна функция

Както при повечето НСПВС, рядко са съобщавани повишени нива на серумните трансаминази, повишаване на серумен билирубин или други параметри на чернодробната функция, както и увеличаване на серумния креатинин, и азота от уреята в кръвта, и други лабораторни нарушения. В повечето случаи това са били незначителни и преходни повишения над нормалните стойности. Ако промените са значителни или постоянни, лечението с мелоксикам трябва да бъде прекъснато и да бъдат проведени съответните изследвания.

Функционална бъбречна недостатъчност

Посредством инхибиране на вазодилатация ефект на бъбречните простагландини, НСПВС могат да предизвикат функционална бъбречна недостатъчност чрез намаляване на гломерулната филтрация. Този нежелан ефект е дозо-зависим. В началото на лечението или след увеличаване на дозата се препоръчва внимателно мониториране на диурезата и бъбречната функция при пациенти със следните рискови фактори:

- Пациенти в старческа възраст
- Съпътстващо лечение с лекарства, като ACE инхибитори, ангиотензин II антагонисти, сартани, диуретици (вж. точка 4.4. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие)
- Хиповолемия (с различен произход)
- Застойна сърдечна дейност
- Бъбречна недостатъчност
- Нефротичен синдром
- Лупусна нефропатия
- Тежка чернодробна дисфункция (серумен албумин <25 g/l или Child-Pugh score ≥10)

В редки случаи НСПВС могат да причинят интерстициален нефрит, гломерулонефрит, бъбречна медуларна некроза или нефротичен синдром.

Дозата мелоксикам при пациенти с краен стадий на бъбречна недостатъчност, подложени на хемодиализа, не трябва да надвишава 7,5 mg. При пациенти с леко до средно бъбречно нарушение не се налага намаляване на дозата (напр. пациенти с креатининов клиренс по-висок от 25 ml/min).



Задържане на натрий, калий и вода.

При приложение на НСПВС е възможно възникване на задръжка на натрий, калий и вода, както и взаимодействие с натриуретичния ефект на диуретиците. Освен това, може да се появят понижаване на антихипертензивния ефект на антихипертензивните лекарства. При податливи пациенти вероятният резултат е задълбочаване или обостряне на сърдечна недостатъчност, хипертония или едем. За рискови пациенти се препоръчва клинично мониториране (вж. точки 4.2 и 4.3).

Хиперкалиемия

Хиперкалиемията може да се благоприятства при болни от диабет или при съпровождаща терапия, водеща до повишени нива на калий (вж. точка 4.5). В такива случаи трябва да се извършва редовно мониториране на нивата на калий.

Други предупреждения и предпазни мерки

Пациенти в старческа възраст, слаби или немощни пациенти, обикновено понасят нежелани лекарствени реакции по-трудно и такива болни трябва да бъдат внимателно наблюдавани. Както и при другите НСПВС, лекарственият продукт трябва да се прилага внимателно при пациенти в напреднала възраст, за които съществува по-голяма вероятност да страдат от нарушения в бъбрената, чернодробна или сърдечна функция. При пациентите в старческа възраст нежеланите лекарствени реакции на НСПВ могат да бъдат по-чести, особено гастроинтестинално кървене и перфорация, които могат да бъдат фатални (вж. точка 4.2).

Мелоксикам, както и другите НСПВС, може да маскира симптомите на вече съществуващо инфекциозно заболяване.

Употребата на мелоксикам, може да наруши женския фертилитет и не се препоръчва при жени, които правят опити да зачатат. По тази причина при жените, които имат затруднения да забременеят или провеждат изследвания за стерилитет трябва да се прекрати употребата на мелоксикам (вж. точка 4.6).

Movalis таблетки 7,5 mg съдържат лактоза. Пациентите с редките наследствени проблеми като галактозна непоносимост, Lapp-лактазна недостатъчност или глюкозно-галактозен синдром на малабсорбция не трябва да приемат този лекарствен продукт.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Изпитвания за взаимодействия са провеждани само при възрастни.

Фармодинамични взаимодействия

Други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) и ацетилсалицилова киселина ≥ 3 g/d:

едновременното прилагане (вж. точка 4.4) с други нестероидни противовъзпалителни средства, включително ацетилсалицилова киселина, прилагана в дози против възпаление ($\geq 1\text{g}$ като единократен прием или $\geq 3\text{g}$, като обща дневна доза) не се препоръчва.

Кортикостероиди (напр. глюкокортикоиди):

Едновременната употреба с кортикостероиди изисква внимание поради повишен риск от кървене или гастроинтестинална язва.

Антикоагуланти или хепарин в дози прилагани в гериатрията или при терапевтични дози:

Съществува повишен риск от кървене, поради потискане на функциите на тромбоцитите и увреждане на лигавицата на stomахa и дванадесетопръстка. НСПВС могат да повишат ефектите на антикоагуланти, като варфарин (вж. точка 4.4). Едновременното приложение на



НСПВС с антикоагуланти или в дози, прилагани в гериатрията, или при терапевтични дози не се препоръчва (вж. точка 4.4).

В оставащите случаи на употреба с хепарин е необходимо внимание, поради повишен риск от кървене. Ако не може да бъде избегнато едновременното предписване на такива лекарствени продукти, е необходимо внимателно мониториране на ефектите на антикоагулантите.

Тромболитици и антитромботични лекарства:

Повишен риск от кървене, поради потискане на функциите на тромбоцитите и увреждане на лигавицата на стомаха и дванадесетопръстника.

Селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRIs):

Повишен риск от гастро-интестинално кървене.

Диуретици, ACE- инхибитори и ангиотензин-II рецепторни антагонисти:

НСПВС могат да понижат ефекта на диуретиците и другите антихипертензивни лекарствени продукти. При някои пациенти с компрометирана бъбреchna функция (напр. дехидратирани пациенти или пациенти в старческа възраст с компрометирана бъбреchna функция) едновременната употреба с ACE- инхибитори или ангиотензин-II рецепторни антагонисти и средства, които инхибират циклооксигеназата може да доведе до допълнително влошаване на бъбреchna функция, включително е възможна остра бъбреchna недостатъчност, която обикновено е обратима. Поради това, при едновременното предписване трябва да се внимава, особено при пациенти в старческа възраст. Пациентите трябва да бъдат адекватно хидратирани и да се обмисли мониториране на тяхната бъбреchna функция след започване на съпътстващото лечение, и това да продължи да се извърши периодично (вж. точка 4.4).

Други антихипертензивни средства (напр. бета-блокери):

Както и за последните, може да настъпи понижаване на ефекта на бета-блокерите (поради инхибиране на простагландините, причиняващи вазодилатация).

Инхибитори на калциневрин (напр. циклоспорин, такролимус):

НСПВС могат да благоприятстват нефротоксичността на инхибиторите на калциневрин чрез медиаторните си ефекти върху бъбреchnите простагландини. По време на комбинираното лечение трябва да се измерва бъбреchna функция. Препоръчва се внимателно мониториране на бъбреchna функция, особено при пациенти в старческа възраст.

Интраутеринни изделия:

Съобщавано е, че НСПВС понижават ефекта на интраутеринните средства, но е необходимо понататъшно потвърждаване.

Фармакокинетични взаимодействия: ефект на мелоксикам върху фармакокинетиката на други лекарства.

Литий:

Съобщавано е, че НСПВС повишават литиевите плазмени нива (поради намалената бъбреchna екскреция на литий), които могат да достигнат токсични стойности. Не се препоръчва едновременната употреба на литий с НСПВС (вж. точка 4.4). Ако такава комбинация е наложителна, трябва внимателно да бъдат мониторирани литиевите плазмени концентрации при започване на лечението с мелоксикам, при определяне на дозировката му и при преустановяване на лечението с лекарствения продукт.

Метотрексат:

НСПВС могат да намалят тубулната секреция на метотрексат и по този начин да повишият плазмената му концентрация. Поради тази причина при пациенти на високи дози метотрексат (над 15 mg седмично) не се препоръчва едновременното прилагане с НСПВС (вж. точка 4.4). Трябва да се има предвид риска от взаимодействие между НСПВС и метотрексат и при пациенти на ниски дози метотрексат, особено при тези с нарушенa бъбреchna функция. В



случай, че е необходимо комбинирано лечение, трябва да се проследяват броя на кръвните клетки и бъбречната функция. Особено внимание се изисква в случай че НСПВС и метотрексат са приети в рамките на 3 дни като в този случай плазмените нива на метотрексат могат да се повишат и да причинят по-висока токсичност. Въпреки че фармакокинетиката на метотрексат (15 mg седмично) не се повлиява значимо от едновременното лечение с мелоксикам, трябва да се има предвид, че хематологичната токсичност на метотрексат може да се засили от лечението с НСПВС (вж. по-горе). (Вж. точка 4.8)

Фармакокинетични взаимодействия: ефект на други лекарства върху фармакокинетиката на мелоксикам

Холестирамин

Холестираминът ускорява елиминирането на мелоксикам чрез прекъсване на ентерохепаталната циркулация, така че клирънса на мелоксикам се повишава с 50 % и времето на полуживот намалява до 13+3 часа. Това взаомодействие има клинична значимост.

Не са открити клинично значими фармакокинетични лекарствени взаимодействия по отношение на едновременната употреба с антиациди, циметицин и дигоксин.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Инхибицията на простагландиновия синтез може нежелано да повлияе бременността и/или ембриофetalното развитие. Данни от епидемиологични проучвания предполагат повишен рисък от спонтанен аборт и от сърдечни малформации и гастрохиза след употребата на инхибитори на простагландиновия синтез в ранна бременност. Абсолютният рисък от сърдечно-съдови малформации е повишен от по-малко от 1% до приблизително 1,5%. Счита се, че риска се повишава с дозата и продължителността на лечението. Прилагането на инхибитори на простагландиновия синтез при животни води до повишиване на пре- и постnidационните загуби и ембриофetalна смъртност. В допълнение се съобщава повищена честота на различни малформации, включително сърдечно-съдови, при животни, на които са приложени инхибитори на простагландиновия синтез по време на органогенезата.

Мелоксикам не трябва да се предписва по време на първия и втория триместър на бременността, освен ако това не е абсолютно необходимо. Ако мелоксикам се употребява от жена, която се опитва да зачне или по време на първия или втория триместър на бременността, трябва да се използва най-ниската възможна доза, за възможно най-кратък период от време.

По време на третия триместър на бременността всички инхибитори на простагландиновия синтез могат да причинят

на фетуса:

- кардио-пулмонална токсичност (с преждевременно затваряне на дуктус артериозус и пулмонална хипертония);
- бъбречна дисфункция, която може да прерастне в бъбречна недостатъчност с олиго-хидроамниоза.

на майката и плода в края на бременността:

- възможно удължаване на времето на кървене, антиагрегантен ефект, който може да се появи дори при много ниски дози;
- инхибиране на маточните контракции, което да доведе до забавяне или удължаване на раждането.

Поради това, мелоксикам е противопоказан по време на третия триместър на бременността.

Кърмене

Известно е, че НСПВС преминават в кърмата, въпреки че няма такъв опит с Moxalix. По тази причина употребата му не се препоръчва при кърмачки.



Кърмене

Известно е, че НСПВС преминават в кърмата, въпреки че няма такъв опит с Movalis. По тази причина употребата му не се препоръчва при кърмачки.

Фертилитет

Употребата на мелоксикам, както и на което и да е друго лекарство, за което е известно, че инхибира циклооксигеназата/простагландиновия синтез, може да наруши женския фертилитет и не се препоръчва при жени, които правят опити да заченат. По тази причина при жените, които имат затруднения да забременеят или провеждат изследвания за стерилитет трябва да се обмисли прекратяване употребата на мелоксикам.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания на ефекта върху способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това, на базата на фармакодинамичния профил и съобщаваните нежелани реакции, по-вероятно е мелоксикам да няма никакво или да оказва незначително влияние върху тези способности. Въпреки това, пациенти при които се появят зрителни нарушения, включително замъглено виждане, световъртеж, сънливост, замаяност или други оплаквания от страна на централната нервна система, трябва да се въздържат от шофиране и работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

a) Общо описание

Клинични проучвания и епидемиологични данни показват, че употребата на някои НСПВС (особено във високи дози и при продължително приложение) може да се свърже с леко повишен риск от артериални тромботични събития (например миокарден инфаркт или инсулт) (вж. т. 4.4.).

Има съобщения за отоци, хипертония и сърдечна недостатъчност, свързани с употребата на НСПВС.

Най-често наблюдаваните нежелани реакции са от страна на гастро-интестиналната система. Могат да се появят пептична язва, перфорация или гастро-интестинално кървене, които понякога са фатални, особено при пациенти в старческа възраст (вж. т. 4.4.). След употреба са съобщавани гадене, повръщане, диария, метеоризъм, констипация, диспепсия, болка в стомаха, мелена, хематемеза, улцерозен стоматит, обостряне на колит и болест на Крон (вж. точка 4.4. - Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба). С по-малка честота е наблюдаван гастрит.

Тежки кожни нежелани реакции (SCARs): докладвани са Stevens-Johnson (SJS) и токсична епидермална некролиза (TEN), (вж. т. 4.4.).

Честотата на наблюдаваните нежелани лекарствени реакции посочени по-долу се базира на съответната проява на съобщаваните нежелани реакции от 27 клинични изпитвания с продължителност на лечението - най-малко 14 дни. Информацията се основава на клинични изпитвания, включващи 15 197 пациенти, които са приемали дневни дози от 7,5 или 15 mg мелоксикам таблетки или капсули за период до една година.

Включени са нежелани лекарствни реакции, появили се в резултат на съобщения получени във връзка с употребата на продукта от пазара.

Нежеланите реакции са класифицирани според честотата, използвайки следната конвенция:
много чести ($\geq 1/10$), чести ($\geq 1/100$ до $< 1/10$), нечести ($\geq 1/1\ 000$ до $< 1/100$), редки ($\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1\ 000$) или много редки ($< 1/10\ 000$), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).



Редки: промени в броя на кръвните клетки (включително в диференциалното броене на белите кръвни клетки), левкопения и тромбоцитопения

Съобщавани са много редки случаи на агранулоцитоза (вж. точка 6)

Нарушения на имунната система

Нечести: алергични реакции, различни от анафилактични- или анафилктOIDни реакции.

С неизвестна честота: анафилактични реакции или анафилктOIDни реакции

Психични нарушения

Редки: изменение на настроението, сънуване на кошмари

С неизвестна честота: чувство на обърканост, дезориентация

Нарушения на нервната система

Чести: главоболие

Нечести: замайване, сънливост

Зрителни нарушения

Редки: нарушения в зрението, включително замъглено зрение; конюнктивит

Нарушения на слуховия апарат

Нечести: световъртеж

Редки: бучене в ушите

Съдечни нарушения

Редки: сърцебиене

Съобщавана е сърдечна недостатъчност, във връзка с лечение с НСПВС.

Съдови нарушения

Нечести: повишено кръвно налягане (вж. точка 4.4), зачеряване

Респираторни, торакални и медиастинални нарушения

Редки: поява на астма при индивиди, алергични към аспирин или други НСПВС.

Гастроинтестинални нарушения:

Много чести: стомашно-чревни нежелани събития като цяло (включващи диспепсия, гадене, повръщане, стомашна болка, констипация, метеоризъм, диария)

Нечести: окултна или макроскопска гастро-интестинална хеморагия, стоматит, гастрит, оригване

Редки: колит, гастро-дуоденална язва, езофагит

Много редки: гастро-интестинална перфорация

С неизвестна честота: панкреатит

Гастро-интестинално кървене, язва или перфорация е възможно понякога да бъдат тежки и потенциално фатални, особено при пациенти в старческа възраст (вж. точка 4.4).

Хепатобилиарни нарушения

Нечести: нарушение на чернодробната функция (напр. повишени нива на трансаминазите или билирубин)

Много редки: хепатит

Нарушения на кожата и подкожните тъкани

Нечести: ангиоедем, пруритус, обрив

Редки: синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза, уртикария

Много редки: булозен дерматит, мултиформена еритема



С неизвестна честота: реакции на фоточувствителност

Бъбречни и пикочополови нарушения

Нечести: задръжка на натрий и вода, хиперкалиемия (вж. точка 4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба) абнормни параметри на бъбречната функция (повишен серумен креатинин и/или серумна урея)

Много редки: остра бъбречна недостатъчност, особено при пациенти с рискови фактори (вж. точка 4.4)

Общи нарушения и условия на мястото на прилагане

Нечести: едем, включително едем на долните крайници

в) Информация характеризираща определени сериозни и/или често появляващи се нежелани реакции

Много редки случаи на агранулоцитоза са съобщавани при пациенти, лекувани с мелоксикам и други потенциални миелотоксични лекарства (вж. точка 4.5).

г) Нежелани реакции, които не са наблюдавани във връзка с продукта, но които като цяло са приети да се свързват с други съединения от този клас

Съобщавано е органно бъбречно увреждане, водещо до остра бъбречна недостатъчност: много редки случаи на интестициален нефрит, остра тубулна некроза, нефротичен синдром и папиларна некроза (вж. точка 4.4).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/рисък за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

Уебсайт: www.bda.bg

4.9 Предозиране

Симптомите на остро предозиране с НСПВ обикновено се ограничават до летаргия, съниливост, гадене, повръщане и епигастрална болка, които в повечето случаи са обратими при съответните мерки. Може да се появи гастро-интестинално кървене. Тежкото отравяне може да предизвика хипертензия, остра бъбречна недостатъчност, чернодробна дисфункция, респираторна депресия, кома, конвулсии, сърдечно-съдов колапс и сърдечен арест. При терапевтично поглъщане на НСПВ са съобщавани анафилактоидни реакции, които може да се появят и след предозоране.

В случай на предозиране, пациентите трябва да бъдат подложени на симптоматично лечение и да бъдат приложени някои общо подкрепящи мерки. В клинично изпитване е било установено, че перорална доза от 4 g холестирамин, приемана три пъти дневно, ускорява елиминирането на мелоксикам.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Нестероидно противовъзпалително средство, Оксикам



ATC код: M01AC06

Мелоксикам е нестероидно противовъзпалително средство /НСПВС/ от класа на оксикамите, което има противовъзпалителни, аналгетични и антипиретични свойства.

Противовъзпалителната активност на мелоксикам е доказана при класически модели на възпаление. Както и при другите НСПВС точният механизъм на действие остава неизвестен. Въпреки това съществува поне един общ начин на действие, характерен за всички НСПВС (включително мелоксикам): инхибиране на биосинтезата на простагландини - известни медиатори на възпалението.

5.2 Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Мелоксикам се абсорбира добре от гастро-интестиналния тракт, което рефлектира като висока абсолютна бионаличност от 90% след перорално приложение (капсули). Таблетките, пероралната суспензия и капсулите са биоеквивалентни.

След прилагане на единична доза мелоксикам, средните максимални плазмени концентрации се достигат в рамките на 2 часа за суспензијата и 5-6 часа за твърдите перорални форми (таблетки и капсули).

При прилагане на многократни дози, steady-state е постигнат за 3 до 5 дни. Дозирането веднъж дневно довежда до средни плазмени концентрации на лекарството с относително по-слабо отклонение на Р/Т концентрации в порядъка от 0,4-1,0 $\mu\text{g}/\text{mL}$ за дози 7,5 mg и 0,8-2,0 $\mu\text{g}/\text{mL}$ за дози 15 mg, респективно (съответно C_{min} и C_{max} при steady state).

Средните максимални плазмени концентрации при steady state се достигат в рамките на 5 до 6 часа за таблетките, капсулите и пероралната суспензия, респективно. Степента на абсорбиране на мелоксикам след перорално приложение, не се променя при едновременно приемане на храна или употребата на неорганични антиациди.

Разпределение

Мелоксикам се свързва много здраво с плазмените протеини, основно с албумин (99%).

Мелоксикам прониква добре в синовиалната течност, за да даде концентрации приблизително половината от тези в плазмата.

Обемът на разпределение е малък, т.е. приблизително 11 L след интрамускулно, или интравенозно приложение и показва индивидуални отклонения от порядъка на 7-20 %. Обемът на разпределение след прием на многократни орални дози мелоксикам (7,5 до 15 mg) е около 16 L с коефициенти на отклонение, вариращи от 11 до 32%.

Биотрансформация

Мелоксикам претърпява екстензивна чернодробна биотрансформация.

В урината се откриват четири различни метаболита на мелоксикам, всички от които са фармакодинамично неактивни. Основният метаболит, 5'-карбоксимелоксикам (60 % от дозата), се образува посредством окисление на междуинния метаболит 5'-хидроксиметилмелоксикам, който също се екскретира, но в по-ниска степен (9 % от дозата). Проведените ин витро проучвания предполагат, че CYP 2C9 играе важна роля в този метаболитен път, с минимален принос от CYP 3A4 изоензим. Вероятно от пероксидазната активност на пациента зависят другите два метаболита, които представляват съответно 16 % и 4 % от приложената доза.

Елиминиране

Мелоксикам се екскретира основно под формата на метаболити, които се откриват в еднаква степен в урината и фекалиите. По-малко от 5 % от дневната доза се екскретира непроменена във фекалиите и само следи от непроменено количество се екскретират в урината. Средният елиминационен полуживот варира между 13 и 25 часа след орално, интрамускулно и интравенозно приложение. Общийт плазмен клирънс е около 7-12 mL/min след еднократни дози, приложени орално, интравенозно или ректално.



Линейност/Нелинейност

Мелоксикам показва линейна фармакокинетика в терапевтичния дозов диапазон от 7,5 mg до 15 mg след перорално или интрамускулно приложение.

Специални популации

Пациенти с чернодробна/бъбречна недостатъчност

Фармакокинетиката на мелоксикам не се повлиява съществено нито от чернодробна, нито от лека до умерено тежка бъбречна недостатъчност. Пациенти с умерено тежко бъбречно увреждане са имали значително по-висок общ лекарствен клирънс. Намалено свързоване с белтъците се наблюдава при пациенти с терминална бъбречна увреда. При терминална бъбречна недостатъчност, повишаването на обема на разпределение може да доведе до по-висока концентрация на свободен мелоксикам и по тази причина не трябва да се надвишава дневната доза от 7,5 mg.

Пациенти в старческа възраст

Пациентите в старческа възраст от мъжки пол проявяват подобни фармакокинетични параметри, в сравнение с тези при млади мъжки индивиди. Пациентите в старческа възраст от женски пол са показвали по-високи AUC-стойности и по-дълъг елиминационен полуживот в сравнение с тези при млади пациенти от двата пола.

Средният плазмен клирънс при steady state при пациенти в напреднала възраст е малко по-нисък от този, който се съобщава при по-младите пациенти.

5.3 Предклинични данни за безопасност

В предклинични изпитвания при повтарящи се високи дози, при два животински вида, е установено, че токсикологичният профил на мелоксикам е идентичен с този на другите НСПВС: гастроинтестинални язви и ерозии, бъбречна папиларна некроза.

Репродуктивни проучвания с перорални дози при плъхове показват намаляване на броя на овулатиите и инхибирането наnidацията и ембриотоксични ефекти (повишен резорбция) при токсични за майката дозови нива от 1 mg/kg или по-високи. Изпитвания за токсичността върху възпроизводството на плъхове и зайци не показват тератогенност до перорални дози от 4 mg/kg при плъхове и 80 mg/kg при зайци.

Изследваните дозови нива надвишават клиничната доза (7,5-15 mg) с коефициент от 10 до 5 пъти, изчислен за mg/kg от базовата доза (при човек с телесно тегло 75 kg). Фетотоксичният ефект в края на бременността, изразен при всички инхибитори на простагландиния синтез е описан. Не са открити данни за мутагенен ефект *in vitro*, нито *in vivo*. Няма открит карциногенен рисков при плъхове и мишки при дози значително надвишаващи клиничните.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Натриев цитрат дихидрат, лактозаmonoхидрат, микрокристална целулоза, повидон K25, безводен, колоиден силициев диоксид, кросповидон, магнезиев стеарат.

6.2 Несъвместимости

Неприложимо.

6.3 Срок на годност

3 години



6.4 Специални условия на съхранение

Няма специални условия на съхранение.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

6.5 Дани за опаковката

Алуминиеви /PVC/PVDC/блистери в картонени кутии, съдъжащи 10 и 20 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

9600237

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 01.10.1996

Дата на последно подновяване: 06.04.2007

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

07/ 2017

