

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

СОФТАКОРТ 3,35 mg/ml капки за очи, разтвор в еднодозов контейнер
SOFTACORT 3,35 mg/ml eye drops, solution in single-dose container

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 ml капки за очи, разтвор съдържа 3,35 mg хидрокортизонов натриев фосфат (*hydrocortisone sodium phosphate*).

Една капка съдържа около 0,12 mg хидрокортизонов натриев фосфат.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Капки за очи, разтвор в еднодозов контейнер.

Разтворът е практически бистър, безцветен до бледожълт разтвор, без частици.

pH: 6,9 – 7,5

Осмоларитет: 280-320 mosmol/kg

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Лечение на леки неинфекциозни алергични или възпалителни заболявания на конюнктивата.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчителната доза е 2 капка 2 до 4 пъти дневно, в засегнатото око.

Продължителността на лечението с тази доза обикновено варира от няколко дни до максимум 14 дни.

За избягване на рецидив при преустановяване на лечението се препоръчва постепенно намаляване на дозата до една апликация през ден.

В случай на недостатъчен отговор е необходимо прилагането на по-мощен кортикоステроид.

Педиатрична популация

Ефикасността и безопасността при педиатричната популация не е установена. Вижте точка 4.4.

Пациенти в старческа възраст

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст.

Начин на приложение

За очно приложение.

Еднократният контейнер съдържа достатъчно разтвор за третиране и на двете очи.
Само за еднократно приложение.

Този лекарствен продукт представлява стерилен разтвор, който не съдържа консервант. Разтворът от всеки еднодозов контейнер трябва да се използва незабавно след отварянето му за приложение в засегнатото око(очи) (вж. точка 6.3).

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1	
Към Рег. №	20170152
Разрешение №	БСИМЧИР-60216
Одобрение №	14-09- 2022



Пациентите трябва да бъдат инструктирани:

- да избягват контакта между върха на апликатора и окото или клепачите,
- да използват капките за очи веднага след отваряне на еднодозовия контейнер и да изхвърлят контейнера след неговата употреба.

Затварянето на назолакрималния път чрез притискане на слъзния канал за една минута може да намали системната абсорбция.

При съществуващо лечение с други капки за очи под формата на разтвор е необходим изчакване на 5 минути между отделните апликации.

4.3 Противопоказания

- Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1;
- Известна глюокортикоид-индуцирана очна хипертензия и други форми на очна хипертензия;
- Остра *herpes simplex virus* инфекция и повече от другите вирусни инфекции на роговицата в остръ стадии на улцерация (с изключение на случаите при комбиниране със специфично химиотерапевтично средство срещу херпесните вируси), конюнктивит с улцеративен кератит дори в начален стадий (положителен флуоресцеинов тест);
- Очна туберкулоза;
- Остра микоза;
- Остра очна гнойна инфекция, гноен конюнктивит и гноен блефарит, ечемик на окото и херпесна инфекция, които могат да бъдат маскирани или влошени от прилагането на противовъзпалителни средства.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Локалните стероиди никога не трябва да се прилагат при недиагностицирано зачерявяне на очите.

Употребата на този лекарствен продукт не се препоръчва за лечение на херпес вирусен кератит, но при необходимост може да се прилага само в комбинация с противовирусно лечение, под строг контрол от страна на офтамолога.

Изтъняването на роговицата и склерата (причинено от заболявания) може да повиши риска от перфорация при употребата на локални стероиди.

В случай на улцерация на роговицата, при продължителна употреба на стероиди е необходимо да се мисли за гъбична инфекция.

Пациентите трябва да бъдат често проследявани по време на лечението с хидрокортизон под формата на капки за очи. Установено е, че продължителното кортикоидно лечение води до очна хипертензия/глаукома, особено при пациенти с предшестващо повишение на вътреочното налягане, предизвикано от стероиди или със съществуващо повищено вътреочно налягане или глаукома (вж. точка 4.3 и точка 4.8), както и образуването на катараракта, особено при деца и пациенти от старческа възраст.

Употребата на кортикоиди може да доведе до опортюнистични инфекции на очите. Поради притискане отговора на гостоприемника или забавеното заздравяване. Освен това, локалните очни кортикоиди може да повишат, влошат или маскират признаците и симптомите на опортюнистичните очни инфекции.



Трябва да се избягва носенето на контактни лещи по време на лечението с кортикоステроиди под формата на капки за очи.

Зрителни смущения

При системно и локално приложение на кортикоステроиди са възможни съобщения за зрителни смущения. Ако при пациент са налице симптоми като замъглено зрение или други зрителни смущения, пациентът трябва да бъде насочен за консултация с офтамолог за оценка на възможните причини, които могат да включват катаракта, глаукома или редки заболявания като централна серозна хориоретинопатия (ЦСХ), за които се съобщава след системно и локално използване на кортикоステроиди.

Това лекарство съдържа 0,227 mg фосфати във всяка капка (вж. също точка 4.8).

Педиатрична популация

При деца, продължителното непрекъснато лечение може да доведе до потискане на надбъбречната функция (вж. точка 4.2).

Очна хипертензия в резултат на прилагането на локални кортикоステроиди при деца възниква по-често и е по-тежка и остра, в сравнение с тази при възрастни.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Съпътстващото лечение с CYP3A инхибитори, включително кобицистат-съдържащи продукти се очаква да повиши риска от системни нежелани ефекти. Необходимо е избягване на комбинирането, освен в случаите, когато ползата превишава повишения риск от системни кортикоステроидни нежелани ефекти, като в този случай пациентите трябва да бъдат проследявани за появата на системни кортикоステроидни нежелани ефекти.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма или са налице ограничени данни от употребата на СОФТАКОРТ при бременни жени.

Кортикоステроидите преминават плацентата. Проучванията при животни показват наличието на репродуктивна токсичност, включително разцепване на небцето (вж. точка 5.3). Клиничната значимост на тези находки не е установена. След системно приложение на високи дози кортикоステроиди са съобщавани ефекти върху плода/новороденото (потискане на интраутеринното развитие, потискане функцията на надбъбречната кора). Въпреки това, подобни ефекти не са наблюдавани при очно приложение.

СОФТАКОРТ не се препоръчва по време на бременност, освен в случаите на абсолютна необходимост.

Кърмене

Системно прилаганите глюкокортикоиди се отделят в кърмата и могат да доведат до потискане на растежа или ендогенното образуване на кортикоステроиди или да имат други нежелани ефекти.

Не е известно дали СОФТАКОРТ отделя в кърмата.

Рискът за новороденото/кърмачето не може да бъде изключен.

Фертилитет

Няма данни за потенциалните ефекти на хидрокортизонов натриев фосфат 3,35 mg/ml върху фертилитета.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания върху способността за шофиране и работа с машини.



Временното замъгяване на зрението или други зрителни нарушения може да окаже влияние върху способността за шофиране или работа с машини. При поява на замъглено зрение, пациентът трябва да изчака до възстановяване на зрението преди шофиране или работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Представяне на нежеланите реакции:

Нежеланите ефекти са категоризирани в зависимост от своята честота както следва: много чести ($\geq 1/10$), чести ($\geq 1/100$ до $< 1/10$), нечести ($\geq 1/1\ 000$ до $< 1/100$), редки ($\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1\ 000$), много редки ($< 1/10\ 000$), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Хидрокортизон

Нарушения на очите:

- С неизвестна честота:
- Парене*, щипане*.

Класови ефекти на кортикоидите

Представените по-долу нежелани лекарствени реакции не са наблюдавани при хидрокортизон, но са познати при други локални киртикоステроиди.

Нарушения на очите:

- С неизвестна честота:

Алергични реакции и реакции на свръхчувствителност, забавено заздравяване на раната, задна капсуларна катараракта*, опортюнистични инфекции (херпес симплекс инфекция, гъбична инфекция, вж. точка 4.4), глаукома*, мидриаза, птоза, кортикоид-индуциранuveйт, промени в дебелината на роговицата*, кристална кератопатия*, замъглено зрение (вж. също точка 4.4).

*виж раздел *Описание на определени нежелани реакции*

Много рядко са съобщавани случаи на калцификация на роговицата, свързани с прилагането на фосфатсъдържащи капки за очи, при някои пациенти със значително увреждане на роговицата.

Описание на определени нежелани реакции:

Парене и щипане може да възникнат непосредствено след прилагането. Тези събития обикновено са леки и преходни, без последствия.

Установено е, че продължителното кортикоидно лечение води до очна хипертензия/глаукома (особено при пациенти с предшестващо повишение на вътреочното налягане, предизвикано от стeroиди или със съществуващо повищено вътреочно налягане или глаукома или фамилна анамнеза за повишение на вътреочното налягане или глаукома), както и образуването на катараракта. Децата и пациентите в старческа възраст могат да бъдат особено податливи на стероид-индуцираното повишение на ВОН (вж. точка 4.4)

Повищението на вътреочното налягане индуцирано от локалното лечение с кортикоиди обикновено се наблюдава в рамките на 2 седмици от лечението (вж. точка 4.4.).

Диабетиците също са по-склонни към развитието на суб capsуларна катараракта след локалното приложение на стероиди.

При заболявания предизвикващи изтъняване на роговицата, локалното приложение на стероиди в някои случаи може да доведе до перфорация (вж. точка 4.4).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарството е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението подозирани за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всичка подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата



ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

4.9 Предозиране

В случай на локално предозиране, свързано с продължително очно дразнене, окото(очите) трябва да бъде изплакнато със стерилна вода.

Продължителното предозиране може да доведе до очна хипертензия. В този случай е необходимо преустановяване на лечението.

Симптомите при случайно погълдане не са известни. Въпреки това, както при другите кортикоステроиди, лекарят може да обмисли провеждането на стомашна промивка или предизвикването на повръщане.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ СРЕДСТВА - кортикостероиди, самостоятелни; АТС код: S01BA02.

Механизъм на действие

Хидрокортизона или кортизола е глюокортикоид, отделян от надбъбречната жлеза, който има противовъзпалително действие, в резултат на освобождаване и индуциране синтеза на специфичен PLA2 инхибитор (липокортин), което води до блокиране на арахидоновата каскада и образуването на флогогенни фактори, като простагландини, тромбоксан, (SRS-A) левкотриени. Този механизъм на действие обяснява противовъзпалително и антиалергично действие на хидрокортизона.

5.2 Фармакокинетични свойства

Фармакокинетично проучване при зайци проведено със СОФТАКОРТ показва, че след прилагане, хидрокортизон бързо преминава във вътречночната течност, роговицата и конюнктивата. Проникването на хидрокортизон е най-високо в роговицата, последвано от конюнктивата и е много ниско във вътречночната течност. Наблюдавана е и слаба системна абсорбция (<2% от приложената доза).

5.3 Предклинични данни за безопасност

Продължителното многократно системно приложение на хидрокортизон при животни води до намаляване на наддаването на телесно тегло, повишен глюконеогенеза и хипергликемия, тимолиза и очна хипертензия.

Репродуктивна токсичност

В проучвания с мишки, очното приложение на хидрокортизон е довело до резорбция на плода и разцепване на небцето. При зайци, очното приложение на хидрокортизон е довело до резорбция на плода и множество аномалии, засягащи главата и корема.

Освен това, след прилагане на кортикостероиди при бременни животни са съобщавани и случаи на потискане на интраутеринното развитие и промени във функционалното развитие на централната нервна система.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества



Динатриев фосфат додекахидрат
Натриев дихидроген фосфат моногидрат
Натриев хлорид
Динатриев едетат
Хлороводородна киселина (за коригиране на pH)
Вода за инжекции.

6.2 Несъвместимости

Не са известни несъвместимости с други лекарствени продукти.

6.3 Срок на годност

2 години в картонената опаковка.

След първо отваряне на сашето: използвайте ендодозовите контейнери в рамките на 1 месец.

След отваряне на контейнера за еднократна употреба, той трябва да се използва веднага и да се изхърли след употреба.

Тъй като след отваряне на индивидуалния ендодозов контейнер стерилността не може да бъде поддържана, всяко останало количество трябва да се изхвърли веднага след използването.

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25°C.

Съхранявайте ендодозовите контейнери в сашето, за да се предпазят от светлина.

За съхранението след първо отваряне на лекарствения продукт, вж. точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

10 ендодозови контейнера (LDPE), съдържащи 0,4 ml капки за очи, разтвор са поставени в четиристойно саше, изработено от хартия / полиетилен / алуминий / етиленов кополимер.

Опаковката съдържа 10 (1x10), 20 (2x10), 30 (3x10) или 60 (6 x 10) ендодозови контейнера.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Laboratoires THEA
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Франция

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Reg. № 20170152



9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 27.04.2017

Дата на последно подновяване:

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Изпълнителна агенция по лекарствата/България www.bda.bg.

